

# باراسيتامول والأطفال



# دواء باراسيتامول والأطفال

يستخدم مسكناً للألم  
وخافضاً للحرارة

دواء آمن وفعال  
إذا استخدم بالطريقة الصحيحة



ومن أسمائه  
التجارية << بانادول | فيفادول | تايلينول

يوجد أشكال  
صيدلانية  
عدة منها:

شرباب



قطرات عن  
طريق الفم



تحاميل



# حاسبة جرعة الباراسيتامول للأطفال



تستخدم لحساب الجرعة  
الصحيحة لدواء الباراسيتامول

على شكل

شراب 

قطرات عن طريق الفم 

للوصول إلى  
الحاسبة

انقر هنا 



تعتمد على:



تركيز الباراسيتامول في  
الشراب أو القطرات



وزن  
الطفل

# لتفادي جرعة باراسيتامول زائدة لطفلك



لا تستخدم باراسيتامول في الوقت  
ذاته مع أدوية أخرى تحتوي على  
باراسيتامول مثل:



أدوية  
الزكام  
والبرد



أدوية  
مضادات  
الحساسية



أدوية  
السعال

# تأكد

إن كان باراسيتامول موجوداً  
في تلك الأدوية من خلال:

قراءة جدول مكونات  
الدواء



سؤال الطبيب أو  
الصيدلي عن مكونات  
الدواء



وجود عبارة "يحتوي  
على باراسيتامول" على  
عبوة الدواء



# عند استخدام باراسيتامول لطفلك دون وصفة طبية يفضل أن تسأل الصيدلي عن:



مدة  
استخدام  
الدواء



عدد الجرعات  
الممكنة خلال  
اليوم الواحد



الجرعة  
المناسبة  
لطفلك



\* تختلف جرعات دواء باراسيتامول من طفل لآخر،  
وذلك بناءً على وزن الطفل وتركيز الدواء

# لا تستخدم

ملعقة عند إعطاء  
الدواء لطفلك

يجب استخدام وحدة  
القياس الموجودة مع  
الدواء (الملعقة، القطارة،  
الغطاء) أو المقياس الذي  
يحدده الصيدلي

# قبل استخدام باراسيتامول

يجب مراجعة

الطبيب إذا:



كان طفلك  
يعاني من أمراض  
في الكبد



كان عمر  
طفلك أقل  
من شهرين



استمر الألم  
أو الحرارة أكثر  
من 3 أيام



ظهرت أعراض حساسية  
مثل: احمرار الجلد أو  
حصول طفح جلدي

في حال ملاحظة أي آثار جانبية أو أي مخالفات،  
فضلاً أبلغ الهيئة عن طريق:



النظام الإلكتروني لرصد  
الأعراض الجانبية (تيقظ)



مركز الاتصال الموحد  
19999