

احتفظ بهذه البطاقة معك في جميع الأوقات  
اعرضها على أي مقدم خدمات صحية يشارك في  
رعايتك الصحية وإذا كنت ستذهب إلى المستشفى

NP-20036

## بطاقة المريض



انشطة خفض المخاطر هذه معتمدة من قبل  
الهيئة العامة للغذاء والدواء

### معلومات للطبيب المعالج

تم وصف إيمبافيلي® (بيجسييتاكوبلان) لهذا المريض، وهو  
قد يزيد من خطر إصابة المريض بعدوى بكتيرية مثل  
البكتيريا العقدية الرئوية والنيسرية السحائية والانفلونزا  
من النوع B.

• قد تصبح العدوى البكتيرية مهددة للحياة إذا لم يتم  
التعرف عليها وعلاجها مبكراً

• راقب المرضى عن كثب بحثاً عن العلامات والأعراض  
المبكرة للعدوى وتقييمها على الفور إذا كان هناك شك في  
العدوى. عالج العدوى المعروفة على الفور.

• اتصل بطبيب المريض في أقرب وقت ممكن إذا كان  
هناك شك في أي عدوى.

لمزيد من المعلومات حول إيمبافيلي®، يرجى الرجوع إلى  
الملخص الكامل لخصائص المنتج.

للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو مخاوف تتعلق  
بالسلامة، اتصل بـ

• المركز الوطني للتبليغ والسلامة الدوائية  
مركز الاتصال الموحد للهيئة العامة للغذاء والدواء:  
19999

– البريد الإلكتروني: npc.drug@sFDA.gov.sa

– الموقع الإلكتروني: http://ade.sFDA.gov.sa

• سويدش اورفان بيوتيرم اي بي (بوبل):

– البريد الإلكتروني: drugsafety@sobi.com

– رقم الجوال: +966590488855

## أظهر هذه البطاقة لأي مقدم رعاية صحية مشارك في رعايتك.

اسم المريض:

الرقم المرجعي للتوزيع الخاضع للرقابة:

اسم الطبيب المعالج:

هاتف الطبيب المعالج :

### يجب على المرضى الذين يتلقون إيمبافيلي® حمل هذه البطاقة في جميع الأوقات.

قد يزيد إيمبافيلي® من خطر إصابتك بالعدوى. قد تصبح العدوى مهددة للحياة إذا لم يتم التعرف عليها وعلاجها مبكرًا. اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو احصل على الرعاية الطارئة على الفور إذا أصابك أي من العلامات والأعراض التالية لعدوى:

- صداع وحمى
- حمى وطفح جلدي
- حمى مصحوبة بقشعريرة أو رعشة أو بدونها

- ضيق التنفس
- ارتفاع معدل ضربات القلب
- تعرق
- صداع مع تيبس الرقبة أو تيبس الظهر
- صداع مع غثيان (الشعور بالإعياء) أو قيء
- حساسية العينين للضوء
- آلام في العضلات مصحوبة بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا
- الارتباك
- ألم أو انزعاج شديد

يرجى الاحتفاظ بهذه البطاقة معك في جميع الأوقات أثناء العلاج ولمدة شهرين بعد آخر جرعة. قد يستمر خطر إصابتك بعدوى لعدة أسابيع بعد آخر جرعة.

• تقلل اللقاحات المضادة للبكتيريا من خطر الإصابة بالعدوى. ومع ذلك، فإن اللقاحات لا تمنع جميع أنواع العدوى.

• سيتأكد طبيبك من تلقيك التطعيم ضد أنواع مختلفة من البكتيريا.

• إذا كنت قد تلقيت هذه اللقاحات في الماضي، فقد لا تزال بحاجة إلى تطعيمات إضافية قبل بدء العلاج باستخدام إيمبافيلي.

• يجب إعطاء هذه التطعيمات قبل أسبوعين على الأقل من بدء العلاج باستخدام إيمبافيلي.

• إذا لم تتمكن من تلقي التطعيم قبل أسبوعين، فسيصف لك الطبيب مضادات حيوية (أدوية لعلاج العدوى البكتيرية) للحد من خطر العدوى لمدة أسبوعين بعد تلقي التطعيم.

• عند تلقيك اللقاح، سيعطى طبيبك رقمًا مرجعيًا للتوزيع الخاضع للرقابة. يجب أن يكتب طبيبك هذا الرقم على بطاقة تنبيه المريض الخاصة بك. سوف تحتاج إلى إظهار هذا الرقم للصيدلي الذي يحتاجه قبل أن يتمكن من صرف إيمبافيلي.