June 2020

1506AE2005376-04



ı^{llı} Bristol Myers Squibb"

علاق نسه المريض

وبديفو فولوماب)

للإبلاغ عن أي اثار جانبية مشتبه بها عبر

نظام الإبلاغ الوطني:

|Loeaら||Letiteice: \xqse.xebni\es.vog.ebls.ebe\\; المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية:

medinfo.saudiarabia@eidereibues.oniipem بسبب بريستول مايرز سكويب، المملكة العربية السعودية:

١٩ الاتصال بالرقم المجاني: ٢٠٠٠٩ ٢٠٠٨ البريد الإلكتروني: es.vog.eb1e@gunb.aqn

او الاتصال على رقم: ١٧٧٠ ع٨٨ ٨٠٠٨

0202 anul

Ull Bristol Myers Squibb

1206AE2005376-04

أوبديفو® (نيفولوماب)

معلومات هامة للمرضى

عليك أن تحمل هذه البطاقة معك دائما لإبلاغ مقدمي الرعاية الصحية أنك تتلقى العلاج بـ أوبحيفو® أو أوبحيفو® مع يرفوي® (إيبيليموماب).

العضلات والعظام:

• الغم، والأنف، والحلق:

المثال الأنف، الجفون).

المعدة والأمعاء:

• الكليتان والمثانة:

• الصدر:

صعوبة السير، آلام بالعضلات أو المفاصل، ضعف عضلي،

تقرحات في الغم أو أغشية مخاطية أخرى (على سبيل

ألم بالصدر، صعوبة التنفس، سعال، عدم انتظام ضربات

القلب، خفقان، (الوعر بضربات القلب أكثر من الطبيعي).

براز داكن، كالقطران أو لزج، وجود دم أو مخاط في البراز،

إسهال، ألم أو طراوة في المعدة أو في منطقة البطن.

انخفاض أو از دياد كمية البول، بول داكن.



– إذا ظهرت عليك أي علامات أو أعراض، أخبر طبيبك على الغور.

أدزاء مختلفة من الحسم، تتضمن العلامات والأعراض التي يحب الانتياه لها فيما يلي، رغم أنها ليست القائمة بأكملها:



قد يتسبب العلاج بـ أوبديغو • في رفع احتمال التعرض للآثار الجانبية الخطيرة أو حتى المهددة للحياة، مما قد يؤثر على

• عامة:

تغيرات في الحالة المزاجية أو السلوك (على سبيل المثال، انخفاض الرغبة الحنسبة، تهيج، نسبان، اكتئاب)، ارتباك، شعور بالاعتلال، حمى، صداع، ازدياد أو انخفاض الشهية،

غثيان أو قيء، نوبات (تشنجات)، تورم العقد اللمفاوية، عطش مغرّط، إجهاد، انخفاض أو ازدياد الوزن، وخز و/أو

• العينان:

تغيرات في الإيصار (على سبيل المثال، تشوش الرؤية، أو مشكلات أُخرى في الرؤية)، احمرار العينين، اصفرا بياض العينين).

• الىشرة:

جِفَافَ البِشرة، حَكَة، طَفَحَ جِلَدَى، بِثُور/تَقْشِر، أَو اصْفَرار (پرقان)، كتل مرتفعة بالجلد/نتوءات، تفاعلات جلدية

مام /

- أخبر طبيبك بأى حالات صحية سابقة، بما فى ذلك إذا ما خضعت لزرع خلايا جذعية تستخدم خلايا جذعية من متبرع ((أي من شخص اخر).
- التشخيص المبكر واتخاذ الإجراءات المناسبة للآثار الجانبية من قبل الطبيب يقللان احتمال الاضطرار إلى ً إيقاف العلاج بـ أوبديفو® أو أوبديفو® مع يرفوى® ىشكل مۇقت أو نھائى.
- العلامات والأعراض التي تبدو طفيفة قد تسوء سريعاً إذا تركت بدون علاج.
 - لا تحاول علاج هذه الأعراض بنفسك.
- قد يتأخر ظهور الأعراض والعلامات وقد تظهر بعد أسابيع أو شهور من حصولك على اخا جاعة.

للمزيد من المعلومات، اقرأ نشرة أوبديفو® الموجودة في عبوة المستحضر على النحو الملائم ودليل معلومات المريض.

1506AE2005376-04 June 2020

	44 44 44	The second second
LIIIAIII	· II M I	ll i"il aa l 🛭 a
وسببب		معلومات ال

اسمالطسي

(الذي وصف أوبديفو • أو أوبديفو • مع يرفوي •)

۱۹۵۵۱ و تنبیب ۱
هاتف العيادة :
هاتف الطوارئ:
.0).4=:===
معلومات الاتصال بي:
معلومات الاتصال بي:
.
معلومات الاتصال بي: اسمي وهاتفي:
.
 اسمي وهاتغي:
 اسمي وهاتغي:
اسمي وهاتغي:
 اسمي وهاتغي:
اسمي وهاتغي:
اسمي وهاتغي:

ن معلومات هامة لمقدمي الرعاية الصحية

- هذا المريض يتلقى العلاج بـ أ**وبديفو** أو أوبديفو مع يرفوى .
- الأعراض الجانبية المرتبطة بالمناعة قد تظهر في أي وقت خلال العلاج أو بعد أشهر من إيقافه.
- یجب الحرص على التشخیص المبكر واتخاذ الإجراءات المناسبة لتقلیل فرصة حدوث أي مضاعفات قد تهدد حیاة المریض.
- من الأفضل استشارة طبيب متخصص في علاج الأورام للتعامل مع الاثار الجانبية المتعلقة بالمناعة.
- یجب علی مقدمي الرعایة الصحیة الرجوع إلی معلومات صرف أوبدیفوالموجودة فی عبوة المستحضر.



يجب على مقدمي الرعاية الصحية الذي يعالج هذا المريض بـ أوبديفو° أو أوبديفو° مع يرفوي° أن يكمل قسم معلومات الاتصال بالطبيب الموجود في البطاقة.

1506AE2005376-04 June 2020