

لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي

هذه البطاقة تحتوي على معلومات السلامة المهمة التي تحتاج أن تكون على دراية بها عند تناولك لدواء أوبسوميت. احمل هذه البطاقة في كل وقت واطهرها لأي طبيب مختص برعايتك الطبية.

أوبسوميت 10 mg
OPSUMIT®
ماسيتنتان
أقراص مغلفة
macitentan
film-coated tablets

تمت مراجعة واعتماد هذه البطاقة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء
نسخة 1 , ديسمبر 2022 CP-177276

يوصى بتناول قرص 10 مليجرام أوبسوميت مرة واحدة في اليوم. قم ببلع قرص كامل مع كوب ماء. لا تمضغ ولا تكسر القرص. يمكنك تناول أوبسوميت مع الطعام أو بدونه.

إذا نسيت تناول أوبسوميت، فخذ الجرعة في أقرب وقت تتذكرها ثم استمر في تناول الأقراص في أوقاته العادية. لا تأخذ ضعف الجرعة لتعويض القرص الذي نسيت تناوله.

رجاء قراءة النشرة الدوائية بعناية لمزيد من المعلومات عن أوبسوميت. استشر الطبيب أو الصيدلي إذا كان لديك أي تساؤل بخصوص العلاج.

7074154

من المهم أن تبلغ طبيبك فوراً عند ظهور أي عرض جانبي أو حدوث حمل أثناء علاجك بدواء أوبسوميت.

مركز العلاج:

اسم الطبيب المعالج:

هاتف الطبيب المعالج:

للحصول على معلومات عن طريقة استخدام الدواء، يرجى الرجوع الى النشرة الداخلية او التواصل مع فرع شركة
جونسن أند جونسن الشرق الاوسط
العنوان: شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، برج ب، الطابق 03، أبراج العليا
هاتف: 966114339133

للابلاغ عن الأعراض الجانبية :
هيئة الغذاء والدواء (المركز الوطني للتيقظ)
البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa
الخط المباشر: 19999
فاكس: 00966112057662
الموقع الإلكتروني: http://ade.sfd.gov.sa

أو ياتسن
بريد إلكتروني: GCC-PV2@its.jnj.com

الخط الساخن: 966540015811

يجب عمل اختبار حمل قبل بدء العلاج بأوسوميت وكل شهر خلال فترة العلاج حتى إذا كنت
تعتقدين أنك غير حامل.
قد يسبب أوسوميت فقر الدم (قلة عدد كريات الدم الحمراء) مثل باقي الأدوية من ذات
المجموعة كما أنه قد يؤثر على الكبد.
يجب على طبيبك أن يطلع على اختبارات الدم قبل بدء العلاج بأوسوميت كما أنه خلال
العلاج عليه فحص:

إذا كان الكبد يعمل بشكل جيد.
تشمل علامات وجود خلل بعمل الكبد الاتي:
- الغثيان (رغبة في التقيؤ)
- الحمى (ارتفاع درجة الحرارة)
- ألم في المعدة (منطقة البطن)
- اليرقان (اصفرار البشرة وبياض العينين)
- بول غامق اللون
- حكة في البشرة
- الخمول والارهاق (التعب غير العادي أو الإجهاد)
- أعراض مشابهة لأعراض البرد
(ألم المفاصل والعضلات والحمى)

إذا لاحظت أية من هذه الأعراض، اخبر طبيبك فوراً.

الحمل

قد يضر أوسوميت بتكون الجنين. لذلك لا يجب عليك تناول أوسوميت في حالة
الحمل ولا يجب أن تحملي خلال فترة تناولك لأوسوميت.
كما أن إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم الرئوي، فإن حدوث الحمل سيؤدي
لتدهور أعراض المرض.

منع الحمل

يجب استخدام وسائل موثوقة لتحديد النسل (منع الحمل) في خلال فترة تناولك
لدواء أوسوميت. تأكد من مناقشة طبيبك في جميع تساؤلاتك.