

معلومات هامة

إيلارس®

(كاناكينوماب)

150 ملغم حقنة تحت الجلد

لعلاج متلازمات الحمى الدورية بما في ذلك:

- المتلازمات الدورية المرتبطة بروتين كرايوبايرين
- المتلازمة الدورية المرتبطة بمستقبل عامل نخر الورم،
- متلازمة فرط الغلوبولين المناعي دي و نقص ميفالونات كيناز
- حمى البحر المتوسط العائلية

EU RMP-V11.2 Oct 2021

يمكنك الإبلاغ عن أي أعراض جانبية أو شكاوى أو لطلب نسخ إضافية من خلال:
شركة نوفارتس - السعودية - قسم سلامة المرضى:

الرقم المجاني: ٨٠٠١٢٤٠٠٧٨

الهاتف: ٠٠٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٠

الفاكس: ٠٠٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٧

الايمل: adverse.events@novartis.com

أو عن طريق الإنترنت: <http://report.novartis.com/>

الهيئة العامة للغذاء والدواء, المركز الوطني للتبليغ الدوائي:

مركز الاتصال الموحد: ١٩٩٩٩

الفاكس: ٠٠٩٦٦١١٢٠٥٧٦٦٢

الايمل: npc.drug@sfd.gov.sa

أو عن طريق الإنترنت: <https://ade.sfd.gov.sa/>

قبل البدء في استخدام كاناكينوماب

العدوى: يجب ألا تبدأ العلاج بكاناكينوماب إذا كان لديك عدوى نشطة تتطلب التدخل الطبي.
اللقاحات: تحدث مع طبيبك حول أي لقاحات قد تحتاج إلى أخذها قبل بدء العلاج بكاناكينوماب.

أثناء العلاج بكاناكينوماب خطر العدوى:

استخدام كاناكينوماب يرتبط بزيادة خطر العدوى، بما في ذلك الأمراض الخطيرة.
• إذا كنت في وضع عدوى قد تحتاج لوقف العلاج بالكاناكينوماب اخطر طبيبك مباشرة اذا كانت لديك حرارة تدوم لفترة أطول من 3 أيام أو أية أعراض أخرى قد تكون بسبب الإصابة بعدوى.

• عليك طلب العناية الطبية على الفور إذا شعرت بأعراض مثل:

- الحرارة ، والسعال، أو الصداع لفترات طويلة.
- احمرار موضعي، دفء، أو تورم في الجلد؛ أو
- استمرار السعال، وفقدان الوزن، وانخفاض درجة حرارة الجسم.

• الحمل :

إذا كنت تستخدم كاناكينوماب أثناء فترة الحمل، من المهم إبلاغ طبيب الطفل أو الممرضة قبل تلقيه أي لقاح. يجب ألا يتلقى طفلك أي لقاحات حية قبل 16 اسبوع على الأقل من تلقيك الجرعة الأخيرة من كاناكينوماب قبل الولادة.

دليل العلاج

يرجى التأكد من اصطحاب قائمة بجميع الأدوية التي تتناولها الآن عند زيارة الطبيب المختص.

اسم المريض:

بالنسبة للأطفال اسم ولي الأمر/الوصى:

تاريخ اول جرعة من كاناكينوماب:

جرعه كاناكينوماب:

اسم الطبيب :

هاتف الطبيب: