

أكسبيت™ (ميوكوفينوليت موفيتيل) ٢٥٠ ملغم كبسولات

دليل ميوكوفينوليت موفيتيل الإرشادي المخصص للمرضى

تمت الموافقة على هذه الوثيقة من قبل الإدارة التنفيذية للتيقظ الدوائي في الهيئة العامة للغذاء والدواء

- أمراض القلب الخلقية (أي أمراض القلب التي تظهر عند الولادة)
- الاضطرابات الخلقية في الجهاز العصبي مثل السننسنة المشقوقة (حالة لا يتطرق فيها العمود الفقري بشكل صحيح عند الجنين)

٣) ما مدى احتمالية إلحاق الجنين بالضرر؟

إذا تعرضت المرأة الحامل لدواء ميوكوفينولات موفيتيل، فشدة خطر يتمثل في تسبب الدواء في حدوث إجهاض أو عيوب خلقية لجنينها (انظر أعلاه). وتبقي درجة هذه الخطورة لدى النساء اللاتي يتعرضن لدواء ميوكوفينولات موفيتيل أعلى من خطرها على النساء اللاتي يتعرضن لغيره من مثبطات المناعة الأخرى (الأدوية التي تضعف جهاز المناعة في الجسم)، وأعلى بكثير من خطرتها على عامة النساء.

فقد أظهرت الدراسات أن نحو نصف (٤٤٪) حالات الحمل من النساء اللاتي يتناولن دواء ميوكوفينولات موفيتيل تنتهي بالإجهاض، مقارنة بنسبة ١٢٪ إلى ٣٣٪ لدى النساء اللاتي يتناولن مثبطات المناعة الأخرى و ١٥٪ - ٢٠٪ لدى عامة النساء.

كما يولد نحو ربع (٢٧٪) الأطفال المولودين لأمهاتهن من يتناولن دواء ميوكوفينولات موفيتيل أثناء الحمل بعيوب خلقية، مقارنة بنسبة ٤٪ إلى ٥٪ من أطفال النساء اللاتي يتناولن مثبطات المناعة الأخرى بعد الزرع، ونسبة ٢٪ إلى ٣٪ في عامة الأطفال الآخرين.

٤) ما الذي يجب على القيام به؟

تُعرض المعلومات الخاصة بالرجال والنساء بشكل منفصل - انظر الصفحة الخلقية للحصول على المعلومات الخاصة بالرجال والمعلومات الخاصة بكل من الرجال والنساء.

معلومات مهمة للمرضى من السيدات

- نظرًا إلى أن دواء ميوكوفينولات موفيتيل يمكن أن يسبب الإجهاض أو عيوبًا خلقية:
- فلا تتناولي دواء ميوكوفينولات موفيتيل إذا كنت حاملاً أو كان من المحتمل أن تصبحي حاملاً ما لم يكن هناك علاج بديل مناسب
 - سيلزمك إجراء اختبار حمل قبل البدء في تناول دواء ميوكوفينولات موفيتيل
 - استخدمي وسائل منع الحمل (تحديد النسل) الفعالة أثناء تناول دواء ميوكوفينولات موفيتيل ولمدة ٦ أسابيع على الأقل بعد آخر جرعة من الدواء
 - تحذثي إلى طبيبك على الفور إذا كنت تعقددين أنك حامل
 - لا تتناول دواء ميوكوفينولات موفيتيل دون التحدث إلى طبيبك
 - تحذثي إلى طبيبك إذا كنت تريدين أن تحلمي، أو إذا كانت لديك أي أستئلة أو مخاوف.

اختبارات الحمل

إذا كنت قادرة على أن تصبحي حاملاً، فسيلزمك إجراء اختبار حمل قبل البدء في تناول دواء ميوكوفينولات موفيتيل. سيشرح لك طبيبك نوع وتوقيت اختبارات الحمل التي يجب إجراؤها قبل وأثناء العلاج بدواء ميوكوفينولات موفيتيل. سيوصي بإجراء اختباري الدم أو البول للكشف عن الحمل؛ ويلزم إجراء الاختبار الثاني بعد ٨ إلى ١٠ أيام من الاختبار الأول وقبل البدء في تناول دواء ميوكوفينولات موفيتيل مباشرةً. قد يقتصر طبيبك إعادة هذه الاختبارات في أوقات معينة (على سبيل المثال، إذا كانت هناك فترة فاصلة بين استخدام وسائل منع الحمل الفعالة). وسيناقش معك نتائج جميع اختبارات الحمل.

وسائل منع الحمل

لضمان عدم الحمل، استخدمي وسائل فعالة لمنع الحمل (تحديد النسل) أثناء تناول دواء

مايكوفينوليت موفيتيل: مخاطر حدوث إجهاض وتشوهات خلقية للأجنة

نقاط رئيسية يجب تذكرها

- يسبب دواء ميوكوفينولات موفيتيل عيوبًا خلقية والإجهاض
- اتبع إرشادات منع الحمل التي قدمها لك طبيبك لتجنب الحمل غير المقصد
- إذا لم تفهم تمامًا المعلومات التي تم إعطاؤها لك، فاطلب من طبيبك أن يشرحها مرة أخرى قبل تناول دواء ميوكوفينولات موفيتيل
- لا تتناول دواء ميوكوفينولات موفيتيل دون التحدث إلى طبيبك
- هذا الدواء مخصص لك فقط - يجب عدم إعطائه لأي شخص آخر لأنه قد يضره
- إذا كنتِ امرأة يمكنكِها أن تصبح حاملاً، فسيلزمك إجراء اختبار حمل قبل البدء في تناول دواء ميوكوفينولات موفيتيل

إذا كنتِ امرأة يمكنكِها أن تصبح حاملاً، أو كنتِ رجلاً متزوجًا يمارس الجماع، فيسيقوم الطبيب بما يأتي:

- التحدث إليك عن مخاطر دواء ميوكوفينولات موفيتيل على الجنين
- التحدث إليك حول كيفية تجنب هذه المخاطر باستخدام وسائل منع الحمل (تحديد النسل) والتخطيط للحمل
- الرد على أي أسئلة أو استفسارات قد تكون لديك

سيساعدك هذا الدليل على تذكر المعلومات التي جرت مناقشتها مع طبيبك. فيلزمك الاحتفاظ به حتى يتمنى لك الرجوع إليه مرة أخرى. كما تلزم قراءة نشرة العبوة المرفقة مع دوائك للحصول على معلومات كاملة حول دواء ميوكوفينولات موفيتيل.

محتويات الدليل:

- هل أنا ضمن الفئة المستهدفة بهذه المعلومات؟
- ما هي المخاطر المحتملة لهذا الدواء؟
- ما مدى احتمالية إلحاق الجنين بالضرر؟
- ما الذي يجب على القيام به؟

١) هل أنا ضمن الفئة المعنية بهذه المعلومات؟

- على الأشخاص الآتي ذكرهم أن يدركوا بشكل خاص مخاطر دواء ميوكوفينولات موفيتيل على الأجنة:
- النساء الحوامل
 - أي امرأة يمكن أن تصبح حاملاً، ومن بينهن الفتيات اللاتي دخلن مرحلة البلوغ
 - وجميع النساء اللاتي لديهن أرحام ولم يبلغن سن انقطاع الطمث
 - الرجال المتزوجون الذين يمارسون الجماع (ومن بينهم الرجال الذين أجروا عملية قطع القناة الدافقة) وأزواجهن اللاتي يمارسون الجماع معهن

٢) ما هي المخاطر المحتملة لهذا الدواء؟

يمكن أن يسبب دواء ميوكوفينولات موفيتيل الإجهاض أو عيوبًا خلقية (المشاكل التي تحدث أثناء نمو الطفل في جسم الأم). إذا تعرضت المرأة الحامل لدواء ميوكوفينولات موفيتيل - عن طريق تناوله بنفسها أو من خلال ممارسة الجماع غير المحمي مع الزوج الذي يتناول هذا الدواء - فقد يسبب ذلك حدوث إجهاض أو عيوب خلقية لطفليها. وسيسبب حدوث ذلك غير واضح.

تشمل العيوب الخلقية التي يمكن أن تحدث ما يأتي:

- تشوهات في الأذنين أو العينين أو الوجه أو الأسنان أو الكلية أو المريء (جزء الجهاز الهضمي الذي يربط الفم بالمعدة)

تفاصيل الاتصال بطبيبك

إذا كانت لديك أسلة عاجلة بشأن مخاطر الحمل أثناء تناول دواء ميكوفينولات موفيتيل، فيرجى الاتصال بطبيبك على أرقام الهاتف الآتية:

| | |
|------------------|--|
| خلال ساعات العمل | |
| بعد ساعات العمل | |

لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة نشرة العبوة.

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من آثار جانبية

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من أي آثار جانبية، فتجب استشارة الطبيب أو الصيدلي أو الممرض. ويشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير واردة في نشرة العبوة.

يُرجى أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها عبر المركز الوطني للتبيّظ (NPC). بالإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة على توفير مزيد من المعلومات حول مدى سلامة استخدام هذا الدواء.

المركز الوطني للتبيّظ (NPC)

١٩٩٩ مرکز الاتصال:

البريد الإلكتروني: [npc.drug@sfda.gov.sa](mailto: npc.drug@sfda.gov.sa)

الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfda.gov.sa>

للمزيد من النسخ، يرجى الاتصال بمكتبنا العلمي:

+٩٦٦ ١١٤٠١٥٤٩

ميكوفينولات موفيتيل ولمدة ٦ أسابيع على الأقل بعد جر عنك الأخيرة. إذا مارست الجماع مع زوجك، فاستخدمي وسبعين موثقين من وسائل منع الحمل في الوقت نفسه، سيحدث إليك طبيبك حول الأشكال المختلفة من وسائل منع الحمل وسيساعدك على تحديد الأفضل لك.

إذا ظنت أنك قد تكونين حاملاً

إذا ظنت أنك قد حملت أثناء تناول دواء ميكوفينولات موفيتيل، أو في غضون ٦ أسابيع بعد جر عنك الأخيرة، فتحثي إلى طبيبك على الفور. من المهم جداً لا توقف عن تناول دواء ميكوفينولات موفيتيل دون التحدث إلى طبيبك أولاً. إذا كنت قد قفت بزراعة عضو، فقد يتم رفض العضو المزروع إذا توقفت عن تناول دواء ميكوفينولات موفيتيل. سيساعدك طبيبك على تحديد ما إذا كنت حاملاً، وسيصحح بما يجب القيام به.

معلومات مهمة للرجال

نظرًا إلى أن دواء ميكوفينولات موفيتيل يمكن أن يسبب الإجهاض وعيوبًا خلقية:

- فاستخدم الواقي الذكري أثناء تناول دواء ميكوفينولات موفيتيل ولمدة ٩٠ يوماً على الأقل بعد جر عنك الأخيرة لتجنب انتقال دواء ميكوفينولات موفيتيل إلى زوجتك.
- يجب أن تستخدم زوجتك وسائل منع الحمل عالية الفاعلية أثناء تناول دواء ميكوفينولات موفيتيل ولمدة ٩٠ يوماً على الأقل بعد جر عنك الأخيرة.
- تحدث إلى طبيبك على الفور إذا ظنت أن زوجتك قد تكون حاملاً.
- لا توقف عن تناول دواء ميكوفينولات موفيتيل دون التحدث إلى طبيبك.
- تحدث إلى طبيبك إذا كنت تتوبي أن تتوجب طفلًا، أو إذا كانت لديك أي أسلة أو مخاوف.

وسائل منع الحمل

يمكن أن يسبب دواء ميكوفينولات موفيتيل الإجهاض وعيوبًا خلقية. كما يمكن أن يننقل دواء ميكوفينولات موفيتيل من خلال السائل المنوي، لذلك يجب لا تحمل زوجتك أثناء تناولك دواء ميكوفينولات موفيتيل. لتجنب انتقال دواء ميكوفينولات موفيتيل إلى زوجتك أثناء ممارسة الجماع، استخدم الواقي الذكري أثناء تناول دواء ميكوفينولات موفيتيل ولمدة ٩٠ يوماً على الأقل بعد جر عنك الأخيرة (حتى إذا كنت قد أجريت عملية قطع القناة الدافقة).

يجب أن تستخدم زوجتك وسائل منع الحمل عالية الفاعلية أثناء تناول دواء ميكوفينولات موفيتيل ولمدة ٩٠ يوماً على الأقل بعد جر عنك الأخيرة.

لا تلجأ إلى حفظ الحيوانات المنوية أثناء تناول دواء ميكوفينولات موفيتيل ولمدة ٩٠ يوماً على الأقل بعد جر عنك الأخيرة.

إذا ظنت أن زوجتك قد تكون حاملاً

إذا ظنت أن زوجتك قد حملت أثناء تناولك دواء ميكوفينولات موفيتيل، أو في غضون ٩٠ يوماً بعد جر عنك الأخيرة، فتحثي إلى طبيبك على الفور. سيساعدك طبيبك على تحديد ما إذا كانت زوجتك حاملاً أم لا، وسوف ينصحوكما بما يجب القيام به.

معلومات مهمة للرجال والنساء

في حال رغبتك في إنجاب طفل

يجب إخبار طبيبك إذا رغبت في إنجاب طفل. من المهم جداً لا توقف عن تناول دواء ميكوفينولات موفيتيل دون التحدث إلى طبيبك. قد يرفض الجسم المزروع إذا توقفت عن تناول دواء ميكوفينولات موفيتيل.

يجب عدم مشاركة دوائلك مع آخرين

فقد وصفت هذا الدواء لك وحدك. ويجب عدم إعطائه لأشخاص آخرين. لأنه قد يؤذيه، حتى إذا كانت أعراض مرضهم هي الأعراض نفسها التي ظهرت عليك. يجب إعادة أي دواء غير مستخدم إلى الصيدلي في نهاية العلاج.

يجب عدم التبرع بالدم

يجب عدم التبرع بالدم أثناء تناول دواء ميكوفينولات موفيتيل ولمدة ٦ أسابيع على الأقل بعد جر عنك الأخيرة.

accord