

رييلوزيل® (لوسباترسييت)

بطاقة المريض

(للنساء في سن الإنجاب)

-هذه الوثيقة موافق عليها من قبل الإدارة التنفيذية للتبقيظ الدوائي في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

معلومات المريض

لا ينبغي استخدام ريبيلوزيل (لوسباترسيبت) أثناء الحمل ولمدة 3 أشهر قبل الحمل. فقد يضر ريبيلوزيل بجنينك.

لا تستخدم ريبيلوزيل إذا كنت حاملاً أو مرضعة، أو يمكن أن تصبحي حاملاً، وأنت لا تستخدمين وسيلة واحدة على الأقل فعالة لغاية منع الحمل.

• قبل بدء العلاج بريبيلوزيل:

1. يجب أن يكون لديك اختبار حمل سلبي مصدق عليه من قبل طبيبك المعالج.
2. يجب عليك مناقشة الطرق الفعالة لمنع الحمل مع طبيبك واستخدام طريقة واحدة على الأقل فعالة لمنع الحمل أثناء تناول ريبيلوزيل ولمدة 3 أشهر على الأقل بعد التوقف عن العلاج بريبيلوزيل.

• يجب إعادة اختبار الحمل على فترات مناسبة.

- أخبري طبيبك فوراً إذا كنت حاملاً أو تعتقدي بأنك حامل أثناء العلاج بريبيلوزيل ولمدة 3 أشهر بعد إيقاف العلاج بريبيلوزيل.

يرجى الاطلاع على الجزء الخلفي من بطاقة التذكير هذه للحصول على معلومات الاتصال الخاصة بطبيبك المعالج.

لمزيد من المعلومات حول النتائج والآثار الجانبية لريبيلوزيل ، يرجى الرجوع إلى نشرة معلومات المريض المحلية الخاصة بريبيلوزيل.

لقد تم وصف ريبيلوزيل لعلاجي:

معلومات الاتصال الهامة

أخصائي الرعاية الصحية الذي وصف ريبيلوزيل:

الاسم: _____

رقم هاتف العيادة: _____

عنوان المستشفى: _____

للإبلاغ عن أي آثار جانبية مشتبه بها عبر نظام الإبلاغ الوطني:

بريستول مايرز سكويب، المملكة العربية السعودية:

عبر البريد الإلكتروني: medinfo.saudiarabia@bms.com

أو الاتصال على الرقم : 8008447710

المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية

الهيئة العامة للغذاء والدواء:

مركز الاتصال: 19999

الرقم المجاني: 8002490000

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa

الموقع الإلكتروني: <http://ade.sfda.gov.sa/>

الفاكس: +966-11-2057662