

<p>بطاقة تنبيهات المريض</p> <p>ريمسيما® (إينفليكسيماب)</p>	<p>اطلب من طبيبك تسجيل نوع وتاريخ آخر فحص (فحوص) لمرض السل (التدرن) أدناه:</p>	<p>يُرجى التأكد أيضًا من توفر قائمة بكل الأدوية الأخرى التي تستخدمها معك في أي زيارة إلى أي أخصائي رعاية صحية</p> <p>قائمة الأدوية الأخرى:</p>	<p>اسم المريض:</p>
	الاختبار:		اسم الطبيب:
	التاريخ:	قائمة بأنواع الحساسية:	رقم هاتف الطبيب:
	النتيجة:		تاريخ بدء العلاج باستخدام ريمسيما:
<p>أظهر هذه البطاقة لأي طبيب يشارك في علاج</p>			طريقة الاستعمال الحالية:

<p>أثناء العلاج باستخدام ريمسيما</p> <ul style="list-style-type: none"> • أخبر طبيبك على الفور إذا لاحظت علامات الإصابة بمشكلة في القلب. تشمل العلامات ضيق النفس أو تورم القدم أو تغيرات في ضربات القلب. <p>الحمل واللقاحات</p> <ul style="list-style-type: none"> • إذا كنت قد تلقيت ريمسيما أثناء الحمل، فمن المهم إبلاغ طبيب طفلك بذلك قبل أن يتلقى طفلك أي لقاح. يجب ألا يتلقى طفلك أي "لقاح حي" مثل BCG (يستخدم للوقاية من مرض السل) خلال 6 أشهر من بعد الولادة. 	<p>أثناء العلاج باستخدام ريمسيما</p> <ul style="list-style-type: none"> • أخبر طبيبك على الفور إذا ظهرت عليك علامات الإصابة بعدوى. تشمل العلامات حدوث حمى أو الشعور بالتعب أو السعال (المستمر) أو ضيق النفس أو فقدان الوزن أو التعرق الليلي أو الإسهال أو الجروح أو مشكلات الأسنان أو الشعور بحرقة أثناء التبول أو علامات "تشبه الأنفلونزا". <p>فشل القلب</p> <p>قبل العلاج باستخدام ريمسيما</p> <ul style="list-style-type: none"> • أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من أي مشكلات في القلب، مثل فشل القلب البسيط. 	<p>العدوى</p> <p>قبل العلاج باستخدام ريمسيما</p> <ul style="list-style-type: none"> • أبلغ طبيبك إذا كنت تعاني من عدوى حتى ولو كانت بسيطة للغاية. • من المهم للغاية أن تخبر طبيبك إذا ما كنت أصبت في السابق بمرض السل (التدرن)، أو إذا كنت على صلة وثيقة بشخص كان مصابًا بمرض السل (التدرن). سيقوم الطبيب بإجراء اختبار عليك لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بمرض السل (التدرن). اطلب من طبيبك تسجيل نوع وتاريخ آخر فحص (فحوص) لك لمرض السل (التدرن) على البطاقة: • أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من الالتهاب الكبدي ب أو إذا كنت تعرف أو تشك أنك حامل لفيروس الالتهاب الكبدي ب. 	<p>تحتوي بطاقة التنبهات هذه على معلومات هامة حول السلامة تحتاج لمعرفةها قبل وأثناء العلاج باستخدام ريمسيما.</p> <p>من المهم أن تقوم وطبيبك بتسجيل اسم العلامة التجارية ورقم الدفعة الإنتاجية لدوائك.</p> <p>احتفظ بهذه البطاقة معك لمدة 4 أشهر بعد جرعة ريمسيما الخاصة بك، أو في حالة الحمل لمدة 6 أشهر على الأقل من بعد مولد طفلك. قد تحدث آثار جانبية لفترة طويلة بعد آخر جرعة لك.</p> <p>الرجاء قراءة "النشرة الدوائية" لريمسيما بعناية قبل بدء استخدام هذا الدواء.</p>
--	--	--	--