



بطاقة طوارئ المريض

- زارلتُو® ٢,٠ مجم**
- زارلتُو® ١,٠ مجم**
- زارلتُو® ١٠ مجم**
- زارلتُو® ٢٠ مجم**

أحمل هذه البطاقة دائمًا معك

أحرص على تقديم هذه البطاقة للطبيب
أو طبيب الأسنان قبل أن يقوم بصرف علاج
أو إجراء عملية جراحية لك

SA- Xarelto - PAC -AR - 1.1
For extra copies please call Bayer Saudi Arabia LLC at +966 12 6573015



- ♦ دم في البول وتلون البول باللون الوردي أو البنى أو براز أحمر أو أسود اللون
- ♦ سعال مصحوب بالدم أو تقيء الدم أو هادة تشبه البن المطحون

كيف أتناول زارلتُو®؟

- ♦ لتحصل على أقصى قدر من الحماية:
تناول زارلتُو على النحو التالي:
- ٢,٠ مجم و ١,٠ مجم مع او بدون طعام
- ١٠ مجم و ٢٠ مجم مع الطعام

متى تلْجأ للطبيب؟

- يصبح تناول أدوية سيولة الدم عدد من الآثار الجانبية أهمها سرعة النزف
- لا تتناول زارلتُو دون استشارة طبيبك المعالج إذا كنت معرضاً للنزف أخطر الطبيب فوراً إذا ظهرت لديك أعراض أو شوهد النزف أو أي من الأعراض التالية:

- ♦ الآلام
- ♦ التورم أو الشعور بعدم الارتياح
- ♦ الصداع والدوار والضعف العام
- ♦ التعرض للكدمات المتكررة وغير المفسرة والنزف من الأنف ومن اللثة ونزف بطيء التوقف من الجروح
- ♦ طمث أو نزيف مهبلي أكثر من المعدل المعتاد

ما الذي ينبغي أن أعرفه أثناء العلاج بأقراص زارلتُو؟

- ♦ يؤدى العلاج بـ (زارلتُو) إلى سيولة الدم ويؤى من جلطات الدم الخطيرة
- ♦ تناول (زارلتُو) كما وصفه لك طبيبك المعالج تماماً وأحرص على تناوله باستظام دون السهو عن أي جرعة لضمان استمرار حمايتك من أي جلطات محتملة
- ♦ لا تتوقف عن تناول زارلتُو قبل استشارة طبيبك المعالج خشية من أي جلطات
- ♦ أخطر الطبيب بأى أدوية أو علاج تتناوله حالياً أو كنت تتناوله في الماضي القريب أو تنوى تناوله في الفترة المقبلة قبل بداية العلاج بزارلتُو
- ♦ أخطر الطبيب أو الجراح أنك تتناول زارلتُو قبل إجراء أي عملية جراحية أو علاج تداخلي

أن أنشطة تقليل المخاطر معتمدة من قبل هيئة العامة للغذاء والدواء

**أني أتناول علاج بأقراص
زارلو (ريفاروكسبان) لضمان سيولة الدم**

كما يرجى أخطار

**في حالات الطوارئ،
الرجاء الاتصال بالطبيب**

الاسم

اسم الطبيب

أمراض أخرى / علاج آخر

الاسم

تليفون

تليفون الطبيب

العنوان

درجة القرابة

ختم / توقيع الطبيب

فصيلة الدم

أو
شركة باير العربية السعودية
+966 12 657 3015 : هاتف
+966 12 653 4992 : فاكس
pv.me@bayer.com : البريد الإلكتروني
و للأستفسارات الطبية الرجاء التواصل على:
Med-info.me@bayer.com

للبلاغ عن الآثار الجانبية للدواء يرجى الاتصال
الهيئة السعودية للغذاء والدواء (SFDA)
المركز الوطني للتبيظ والسلامة الدوائية (NPC)
الهاتف الثابت: 19999
الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfda.gov.sa>
البريد الإلكتروني: [npc.drug@sfda.gov.sa](mailto: npc.drug@sfda.gov.sa)

**معلومات هامة
لمسؤول الرعاية الصحية**

♦ لا يعتمد على نسبة التوسيع الفياسي
للسيولة (آي-آن-آر INR) كمقاييس دقيق
لسيولة الدم أثناء تناول العلاج
بأقراص زارلو

الوزن تاريخ الميلاد