

زيجانز^م
(توفاسيتينيب)
بطاقة سلامة مريض



بطاقة سلامة مريض

تصنع بطاقة سلامة المريض بالحجم المناسب من مادة متينة يسهل حملها

- يرجى طلب العناية الطبية على الفور والتوقف عن تناول زيلجانز حتى مناقشة الأمر مع طبيبك:
- ما شعرت بأعراض الحساسية مثل ضيق الصدر، أو صعوبة التنفس، أو الدوخة الشديدة أو الدوار، أو تورم في الشفتين أو اللسان أو الحلق، أو الحكة أو الطفح الجلدي عند تناول زيلجانز، أو بعد تناوله بقليل

معلومات أخرى: (برجاء استكمال البيانات):

اسم المريض: _____
اسم الطبيب: _____
رقم هاتف الطبيب: _____
رقم فاكس بالطبيب: _____
إسم المستشفى: _____
رقم هاتف المستشفى: _____
تاريخ البدء العلاج بعقار زيلجانز: _____

إذا ما توقف عن تناول زيلجانز ، عليك الاحتفاظ بهذه البطاقة لمدة شهرين على الأقل بعد تناول آخر جرعة من زيلجانز

برجاء الإبلاغ عن أي حالات للأثار الجانبية إلي المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية

فاكس رقم: ٠٠٩٦٦١١٢٠٥٧٦٦٢

الرقم الموحد: ١٩٩٩٩

الرقم المجاني: ٨٠٠٢٤٩٠٠٠٠

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa

الموقع الإلكتروني: www.sfd.gov.sa/npc

أو

قسم التيقظ الدوائي بشركة فايزر

البريد الإلكتروني: SAU.AEReporting@Pfizer.com

هاتف رقم: ٠١٢٢٢٩٣٦٣٣

بطاقة سلامة مريض لدواء زيلجانز

(توفاسيتينيب)

- تحتوي هذه البطاقة على معلومات هامة لسلامتك ينبغي أن تكون على علم بها قبل البدء في تناول زيلجانز في حال صعوبة فهم المعلومة، كل ما عليك سؤال الصيدلي/ الطبيب المتابع لحالتك حتى يوضحها لك.
- احتفظ بهذه البطاقة واعرضها على الصيدلي/ الطبيب المتابع لحالتك.
- لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على نشرة زيلجانز الموجودة بالعبوة.
- عليك أن تخبر الطبيب أو الصيدلي المتابع لحالتك بكافة الأدوية التي تتناولها بما في ذلك الأدوية بوصف من الطبيب أو بدون وصفته والفيتامينات و المكملات العشبية.
- لا يوصى باستخدام زيلجانز مع مجموعة الأدوية المضادة للروماتيزم الحيوية المستخدمة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي أو مع مجموعة أخرى من العقاقير التي تضعف من جهازك المناعي(على سبيل المثال أزانثوبرين أو تاكروليموس أو سيكلوسبورين أو ميكوفينولات). تناول زيلجانز مع هذه الأدوية قد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.
- أثناء العلاج باستخدام زيلجانز

عليك أن تخبر طبيبك على الفور إذا ما:

- ظهرت عليك أعراض العدوى مثل الحمى أو الكحة المستمرة أو خسارة في الوزن أو الشعور بالوهن الشديد. قد يزيد زيلجانز من خطر التعرض للإصابة بالعدوى والتي قد تزيد خطورتها إن لم يتم علاجها. قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى إذا كنت تبلغ من العمر 65 عاما أو أكثر أو تعاني من مرض السكري و داء الرئة المزمن أو تتناول مضادات الالتهاب (الكورتيكو ستيرويدية). قد يقوم الطبيب المعالج بإيقاف العلاج زيلجانز.
- تعاملت عن قرب مع شخص يعاني من مرض السل.
- ظهرت لديك علامات وأعراض باطنية منها الشعور بألم في المعدة أو ظهور دم في البراز أو أي تغيرات في عاداتك في التبرز مع الإصابة بالحمى.
- عانيت من الاصفرار الشديد بالجلد أو الغثيان أو التقيؤ.
- كان من الضروري أن تتلقى أي نوع من التطعيمات. هناك أنواع معينة من التطعيمات لا يجب عليك تلقيها أثناء تناول زيلجانز.
- أصبحت حامل أو كانت لديك النية للحمل. لا يجب عليك استخدام زيلجانز أثناء فترة الحمل ما لم يكن ضروريا. تنصح النساء في سن الحمل باستخدام موانع للحمل أثناء العلاج باستخدام زيلجانز ولمدة أربعة أسابيع على الأقل بعد آخر جرعة. لا يجب تناول زيلجانز أثناء فترة الرضاعة.