

# معلومات هامة

ILARIS®  
(canakinumab)

لعلاج التهاب مفاصل الأطفال النشط مجهول السبب

يمكنك الإبلاغ عن أي أعراض جانبية من خلال:

شركة نوفارتس

تليفون : +٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٠

فاكس : +٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٧

البريد الإلكتروني : [adverse.events@novartis.com](mailto:adverse.events@novartis.com)

الهيئة العامة للغذاء والدواء المركز الوطني للتيقظ الدوائي

الرقم المجاني: ٨٠٠٢٤٩٠٠٠٠

الفاكس: +٩٦٦١١٢٠٥٧٦٦٢

الاييميل : [npc.drug@sfda.gov.sa](mailto:npc.drug@sfda.gov.sa)

أو عن طريق الانترنت : <https://ade.sfda.gov.sa>

## قبل بدء استخدام كاناكينوماب

**العدوى:** يجب ألا تبدأ العلاج بكاناكينوماب إذا كان لديك عدوى نشطة تتطلب التدخل الطبي.

## أثناء العلاج بكاناكينوماب

### خطر العدوى:

استخدام كاناكينوماب يرتبط بزيادة خطر العدوى، بما في ذلك الأمراض الخطيرة.

• إذا كنت في وضع عدوى قد تحتاج لوقف العلاج بالكاناكينوماب وتخبر طبيبك إذا كانت لديك حرارة تدوم لفترة أطول

من ٣ أيام أو أية أعراض أخرى قد تكون بسبب الإصابة بعدوى.

• عليك طلب العناية الطبية على الفور إذا شعرت بأعراض مثل:

- الحرارة ، والسعال، أو الصداع لفترات طويلة.

- احمرار موضعي، دفا، أو تورم في الجلد؛ أو

- استمرار السعال، وفقدان الوزن، وانخفاض درجة حرارة الجسم.

### • الحمل :

إذا كنت تستخدم كاناكينوماب أثناء فترة الحمل، من المهم إبلاغ طبيب الطفل أو الممرضه قبل تلقيه اي لقاح. يجب الا

يتلقى طفلك اي لقحات قبل ١٦ اسبوع على الاقل من تلقيك الجرعه الأخيره من كاناكينوماب قبل الولادة.

## العلاج

يرجى التأكد من اصطحاب قائمة بجميع الأدوية التي تتناولها الآن عند زيارة الطبيب المختص.

اسم المريض: .....

بالنسبة للأطفال اسم ولي الأمر/الوصي: .....

تاريخ أول جرعة من كاناكينوماب: .....

جرعة كاناكينوماب: .....

اسم الطبيب : .....

هاتف الطبيب: .....