

- خطر العدوى:** ويرتبط الإيلاريس® مع زيادة خطر العدوى، بما في ذلك الأمراض الخطيرة. تحدث مع طبيبك إذا كان لديك حرارة تدوم لفترة أطول من 3 أيام أو أية أعراض أخرى قد تكون بسبب الإصابة بعدوى
- خطر الحساسية:** عليك التماس العناية الطبية على الفور إذا شعرت بأعراض مثل: (أ) الحرارة ، والسعال، أو الصداع لفترات طويلة. (ب) احمراراً موضعياً، دفع، أو تورماً في الجلد؛ أو (ج) استمرار السعال، وفقدان الوزن، وانخفاض درجة حرارة الجسم
- الجرعات الزائدة:** إذا قمت بحقن الكثير من إيلاريس®، تحدث مع طبيبك
- نسبيت جرعة:** إذا نسيت استخدام إيلاريس®، قم بحقن الجرعة التالية بمجرد التذكر. ثم تحدث إلى طبيبك لمناقشة متى يجب حقن الجرعة التي تليها

تواتر العلاج بـإيلاريس®

تاريخ البدء _____ **تاريخ أحدث جرعة تناولتها:** _____

جرعتي:

يرجى التأكد من اصطحاب قائمة بجميع الأدوية التي تتناولها الآن عند زيارة الطبيب المختص.

اسم المريض:

بالنسبة للأطفال اسم ولد الأمر / الوصي:

اسم الطبيب: _____ **تلفون الطبيب:** _____

احتفظ بهذه البطاقة معك في جميع الأوقات. قد يتسبب إيلاريس® في آثار جانبية، على الرغم من أنها قد لا تصيب جميع الأشخاص. أخبر طبيبك إذا كنت تعتقد أنك تعاني من الآثار الجانبية التي تزعجك أو لا تنتهي.

يمكنك الإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو أي خلل بالمستحضر من خلال وسائل التواصل التالية:
 الهيئة العامة للغذاء والدواء المركز الوطني للتقيف الدولي
 الرقم المحمائي: 8002490000
 + 966 11 2057662
 الفاكس: 966 11 2057662
 البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa
 أو عن طريق الإنترنت:
<https://ade.sFDA.gov.sa/>
 أو عن طريق نوفارتس
 تليفون: + 966 11 2658100
 فاكس: + 966 11 2658107
 البريد الإلكتروني: adverse.events@novartis.com