

# معلومات هامة

## إيلارس® (كاناكينوماب)

١٥٠ ملغم حقنة تحت الجلد  
لعلاج نوبات التهاب المفاصل النقرسي

يمكنك الإبلاغ عن أي أعراض جانبية أو شكاوى أو نطلب نسخ إضافية من خلال:  
شركة نوفارتس - السعودية - قسم سلامة المرضى:

الرقم المجاني: ٨٠٠١٢٤٠٠٧٨

الهاتف: ٠٠٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٠

الفاكس: ٠٠٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٧

الايمل: [adverse.events@novartis.com](mailto:adverse.events@novartis.com)

أو عن طريق الإنترنت: <http://report.novartis.com/>

الهيئة العامة للغذاء والدواء, المركز الوطني للتبقيط الدوائي:

مركز الاتصال الموحد: ١٩٩٩٩

الفاكس: ٠٠٩٦٦١١٢٠٥٧٦٦٢

الايمل: [npc.drug@sfd.gov.sa](mailto:npc.drug@sfd.gov.sa)

أو عن طريق الإنترنت: <https://ade.sfda.gov.sa/>

## قبل البدء في استخدام كاناكينوماب

- **العدوى:** يجب ألا تبدأ العلاج بكاناكينوماب إذا كان لديك عدوى نشطة.
- **اللقاحات:** تحدث مع طبيبك حول أي لقاحات قد تحتاج إلى أخذها قبل بدء العلاج بكاناكينوماب.

## أثناء العلاج بكاناكينوماب

- **خطر العدوى:** استخدام كاناكينوماب يرتبط بزيادة خطر العدوى، بما في ذلك الأمراض الخطيرة. إذا كنت في وضع عدوى قد تحتاج لوقف العلاج بكاناكينوماب أخبر طبيبك **مباشرة** إذا كانت لديك حرارة تدوم لفترة أطول من ٣ أيام أو أية أعراض أخرى قد تكون سبب الإصابة بعدوى.
- عليك طلب العناية الطبية على الفور إذا شعرت بأعراض مثل:
  - الحرارة، والسعال، أو الصداع لفترات طويلة أو
  - احمرار موضعي، دفا أو تورم في الجلد أو
  - استمرار السعال، وفقدان الوزن، وانخفاض درجة حرارة الجسم.

## ■ الحمل:

إذا كنت تستخدم كاناكينوماب أثناء فترة الحمل، من المهم إبلاغ طبيبك الطفل أو الممرضة قبل تلقيه أي لقاح. يجب ألا يتلقى طفلك أي لقاحات حية قبل ١٦ أسبوع على الأقل من تلقيك الجرعة الأخيرة من كاناكينوماب قبل الولادة.

## دليل العلاج

يرجى التأكد من اصطحاب قائمة بجميع الأدوية التي تتناولها الآن عند زيارة الطبيب المختص.

اسم المريض:.....

تاريخ أول جرعة من كاناكينوماب:.....

جرعة كاناكينوماب:.....

اسم الطبيب:.....

هاتف الطبيب:.....