

للبالغين

بطاقة تذكير للمريض

أبريلادا (Abrilada) * أداليموماب (قلم مسبق التعبئة ٤٠ ملجم / ٨,٠ مل & محقنة مسبقة).
معلومات لك ولمتخصصي الرعاية الصحية المشاركين في تقديم الرعاية الطبية لك أو علاجك.
لا تتضمن هذه البطاقة جميع الآثار الجانبية المحتملة، لذا يرجى قراءة نشرة حقن أبريلادا أو التحدث مع طبيبك
للحصول على مزيد من المعلومات حول الآثار الجانبية المحتملة.
إذا كانت لديك أي أسئلة، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

تحتوي هذه البطاقة على معلومات أمان مختارة ومهمة تحتاج إلى الإلمام بها قبل وأثناء العلاج باستخدام حقن أبريلادا

- احتفظ بهذه البطاقة معك في جميع الأوقات و حتى ٧٠ يوم بعد حصولك على آخر حقنة لك باستخدام أبريلادا.
- أظهر هذه البطاقة لأي طبيب أو أخصائي رعاية صحية يفحصك.
- سجل أي معلومات حول أي فحص أو علاج لمرض السل، تكون قد خضعت له، على ظهر هذه البطاقة.

مقدمة:

إن حقن أبريلادا هي دواء مخصص لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، التهاب المفاصل الشبائي مجهول السبب،
التهاب المفاصل الفقاري المحوري، التهاب المفاصل الصدفي، الصدفية، الصدفية اللويحية لدى الأطفال، التهاب الغدد
العرقية القيحي، مرض كرون لدى البالغين والأطفال، التهاب القولون التقرحي لدى البالغين والأطفال، التهاب
القرح لدى البالغين والأطفال، وعلى الرغم من أن علاج أبريلادا يُعد فعالاً في علاج هذه الأمراض، إلا أن بعض
الأشخاص قد يعانون من واحد أو أكثر من الآثار الجانبية. من المهم التحدث إلى طبيبك حول الفوائد المحتملة
والآثار الجانبية المحتملة لحقن أبريلادا، والتي يمكن أن تختلف من شخص لآخر.

- الغرض من هذه البطاقة هو إعلامك ببعض الآثار الجانبية المحتملة لدواء أبريلادا.
- تشمل بعض الآثار الجانبية الخطيرة التي يمكن أن تحدث؛ الالتهابات، والسرطان، ومشاكل الجهاز العصبي.
- هذه ليست جميع الآثار الجانبية المحتملة لحقن أبريلادا.

قبل العلاج بحقن أبريلادا:

أخبر طبيبك عن أي مشاكل صحية تعاني منها، وأي أدوية تتناولها، حيث سيساعدك هذا أنت وطبيبك على تحديد
ما إذا كانت حقن أبريلادا مناسبة لك أم لا.

أخبر طبيبك إذا كنت:

- تعاني من التهاب أو يظهر عليك أعراض التهاب (مثل الحمى والشعور بالتعب).
 - مصاب بالسل أو تعاملت بشكل قريب مع شخص مصاب بالسل.
 - مصاب أو كنت مصاباً في الماضي بالسرطان.
 - تعاني من أي تنميل أو وخز، أو تعاني من مشكلة تؤثر على جهازك العصبي، مثل التصلب المتعدد.
- يجب على طبيبك أن يفحصك جيداً بحثاً عن علامات وأعراض السل قبل البدء في الخضوع للعلاج بحقن أبريلادا،
قد تحتاج إلى العلاج من مرض السل أولاً قبل أن البدء في استخدام أبريلادا.

التطعيمات:

- يمكنك الحصول على التطعيمات، ماعدا اللقاحات الحية.
- إذا خضعت للعلاج بحقن أبريلادا أثناء فترة الحمل، فمن المهم إخبار طبيب طفلك الصغير بذلك قبل أن يتلقى الطفل الصغير أي لقاح، يجب ألا يحصل طفلك الصغير على لقاحات حية BCG (المستخدم للوقاية من السل) في غضون الخمس أشهر الأولى بعد تاريخ حصولك على آخر حقنة أبريلادا أثناء فترة الحمل.
- **أثناء العلاج باستخدام حقن أبريلادا:**
- لضمان عمل أبريلادا بشكل صحيح وآمن لك، يتوجب عليك مراجعة طبيبك بانتظام للاستفسار عن حالتك، أخبر طبيبك على الفور بأي تغييرات تطرأ على حالتك.

أبقى طبيبك على علم بكيفية عمل أبريلادا .

- اتصل بطبيبك على الفور بشأن أي أعراض غير عادية قد تعاني منها، سيساعدك هذا في ضمان حصولك على الرعاية المناسبة، كما أنه سيقلل من فرصة تفاقم الآثار الجانبية.
- يمكن التعامل مع العديد من الآثار الجانبية- بما في ذلك الالتهابات- إذا أخبرت طبيبك عنها على الفور.
- إذا تعرضت لأي أثر جانبي، سيقرر طبيبك ما إذا كان ينبغي لك أن تواصل أو توقف العلاج باستخدام حقن أبريلادا، من المهم التحدث مع طبيبك لمعرفة ما هو الأنسب لك.
- نظرًا لأن الآثار الجانبية يمكن أن تحدث بعد آخر جرعة لك من العلاج بحقن أبريلادا، فلا تنس أن تُخبر طبيبك عن أي مشاكل قد تعاني منها من موعد آخر حقنة لك من أبريلادا.

أخبر طبيبك عن:

- أي حالات طبية جديدة تعاني منها.
- الأدوية الجديدة التي ستناولها.
- أي عملية جراحية تخطط أن تخضع لها.
- قد يعاني بعض الأشخاص الذين يخضعون للعلاج باستخدام حقن أبريلادا من آثار جانبية خطيرة، بما في ذلك:

الالتهابات:

- تساعد حقن أبريلادا الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض الالتهابية عن طريق إحصار جزء من جهاز المناعة، ومع ذلك، فإن هذا الجزء من الجهاز المناعي يساعد أيضًا في مكافحة العدوى والالتهابات، وهذا يعني أن دواء أبريلادا يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والالتهاب، أو يجعل أي عدوى قد تعاني منها أكثر سوءًا، وهذا يشمل الالتهابات؛ مثل نزلات البرد أو الالتهابات الأكثر خطورة مثل السل.

السرطان:

- في حال حصولك على حقنة أبريلادا، فقد يزداد خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطانات.

مشاكل الجهاز العصبي:

• يعاني بعض الأشخاص من مشاكل جديدة أو متفاقمة في الجهاز العصبي مع استخدام حقن أبريلادا، وهذا يشمل مرض التصلب المتعدد.

يُرجى قراءة نشرة أبريلادا للحصول على المزيد من المعلومات، فهذه ليست كل الآثار الجانبية المحتملة التي قد تحدث أثناء العلاج باستخدام أبريلادا.

اتصل بطبيبك أو احصل على رعاية طبية فورية إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية لهذه الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة:

الالتهابات:

• حمى، قشعريرة، تعرق غير عادي، شعور بتوعك أو تعب أكثر من المعتاد، شعور بالمرض (مثل القيء)، إسهال، آلام المعدة، فقدان الشهية أو فقدان الوزن، السعال أو سعال الدم أو المخاط، ضيق التنفس، مشاكل التبول، تقرحات الجلد، الجروح، آلام العضلات.

مشاكل الجهاز العصبي:

• تنميل أو وخز، اضطرابات في الرؤية، ضعف عضلي.

أخبر طبيبك عن أي أعراض غير عادية قد تعاني منها أثناء العلاج باستخدام حقن أبريلادا، فهذه ليست جميع الأعراض المحتملة لهذه الآثار الجانبية.

معلومات تخصصك وتخصصي الرعاية الصحية المشاركين في تقديم الرعاية لك أو علاجك.

اختبارات السل وعلاجه:

ضع علامة على هذا المربع إذا كنت قد خضعت لأي فحص لمرض السل في أي وقت:

نعم (استشر طبيبك إذا كنت لا تعرف)

ضع علامة على هذا المربع كانت نتيجة فحص مرض السل إيجابية:

نعم (استشر طبيبك إذا كنت لا تعرف)

ضع علامة على هذا المربع إذا كنت قد تناولت أي حبوب لعلاج السل أو الوقاية منه:

نعم (استشر طبيبك إذا كنت لا تعرف)

يرجى قراءة نشرة أبريلادا للحصول على مزيد من المعلومات، إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، فتحدث إلى طبيبك أو أخصائي رعاية صحية آخر.

اسمك:

اسم طبيبك (الذي وصف لك علاج أبريلادا):

رقم هاتف طبيبك:

دواعي الاستعمال:

تاريخ إعطاءك حقنة أبريلادا الأولى:

جرعة حقنة أبريلادا المقدمة لك:

تاريخ إعطاءك حقنة أبريلادا الأخيرة (إذا لم تعد تُعطى حقن أبريلادا الآن):

يرجى ملء المعلومات الخاصة بك ومختصي الرعاية الصحية المشاركين في تقديم الرعاية الطبية لك أو علاجك.
للإبلاغ عن الأعراض الجانبية:

المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية (NPC) بالهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA)

رقم مركز اتصال الهيئة العامة للغذاء والدواء: ١٩٩٩٩

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa

الموقع الإلكتروني: /http://ade.sfda.gov.sa

قسم التيقظ الدوائي في الشركة

البريد الإلكتروني: SAU.AEReporting@pfizer.com



فايزر السعودية المحدودة

الرياض - حي العقيق

مركز الملك عبدالله المالي (كافد)

مبنى 4.07

الرمز البريدي 13519

تليفون: +966122293500

فاكس: +966122293692

هذه البطاقة معتمدة من الإدارة التنفيذية للتيقظ الدوائي في الهيئة العامة للغذاء والدواء.
للحصول على نسخ إضافية من بطاقة التذكير الخاصة بالمريض، يرجى إرسال رسالة تحتوي على بيانات الاتصال والعدد المطلوب إلى
عنوان البريد الإلكتروني SAU.AEReporting@Pfizer.com