

## للأطفال

بطاقة تذكير للمريض.

أبريلادا (Abrilada) \* أداليموماب (قلم مسبق التعبئة ٤٠ ملجم / ٨,٠ مل & محقنة مسبقة).  
معلومات لك وملتخصي الرعاية الصحية المشاركين في تقديم الرعاية الطبية لطفلك أو علاجه.  
لا تتضمن هذه البطاقة جميع الآثار الجانبية المحتملة، لذا يرجى قراءة نشرة حقن أبريلادا أو التحدث مع طبيب  
طفلك للحصول على مزيد من المعلومات حول الآثار الجانبية المحتملة.  
إذا كانت لديك أي أسئلة، فتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية لطفلك حول علاج طفلك.

تحتوي هذه البطاقة على معلومات أمان مختارة ومهمة تحتاج إلى الإلمام بها قبل وأثناء علاج طفلك باستخدام حقن أبريلادا

- احتفظ بهذه البطاقة معك في جميع الأوقات و حتى ٧٠ يوم بعد آخر حقنة لطفلك باستخدام أبريلادا.
- أظهر هذه البطاقة لأي طبيب أو أخصائي رعاية صحية يفحص طفلك.
- سجل أي معلومات حول أي اختبارات أو علاج لمرض السل، يكون طفلك قد خضع له، على ظهر هذه البطاقة.

## مقدمة:

إن حقن أبريلادا هي دواء مخصص لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، التهاب المفاصل الشبائي مجهول السبب،  
التهاب المفاصل الفقاري المحوري، التهاب المفاصل الصدفي، الصدفية، الصدفية اللويحية لدى الأطفال، التهاب الغدد  
العرقية القيحي، مرض كرون لدى البالغين والأطفال، التهاب القولون التقرحي لدى البالغين والأطفال، التهاب القزحية  
لدى البالغين والأطفال، وعلى الرغم من أن أبريلادا فعّالاً في علاج هذه الأمراض، قد يعاني بعض الأشخاص من واحد  
أو أكثر من الآثار الجانبية. من المهم التحدث إلى طبيب طفلك حول الفوائد المحتملة والآثار الجانبية المحتملة لحقن  
أبريلادا، والتي يمكن أن تختلف من شخص لآخر.

- الغرض من هذه البطاقة هو إعلامك ببعض الآثار الجانبية المحتملة لدواء أبريلادا.
- تشمل بعض الآثار الجانبية الخطيرة التي يمكن أن تحدث؛ الالتهابات، والسرطان، ومشاكل الجهاز العصبي.
- هذه ليست جميع الآثار الجانبية المحتملة لحقن أبريلادا.

## قبل العلاج بحقن أبريلادا:

أخبر طبيب طفلك عن أي مشاكل صحية يعاني منها طفلك، وأي أدوية يتناولها طفلك، حيث سيساعدك هذا أنت  
وطبيب طفلك على تحديد ما إذا كانت حقن أبريلادا مناسبة لطفلك أم لا.

## أخبر طبيب طفلك إذا كان طفلك:

- يعاني من التهاب أو تظهر عليه أعراض التهاب (مثل الحمى و الشعور بالتعب).
- مصاب بالسل أو تعامل بشكل قريب مع شخص مصاب بالسل.
- مصاب أو كان مصاباً بالسرطان.
- يعاني من أي تنميل أو وخز، أو يعاني من مشكلة تؤثر على الجهاز العصبي لطفلك، مثل التصلب المتعدد.

يجب على طبيب طفلك أن يفحصه جيدًا بحثًا عن علامات وأعراض السل قبل البدء في الخضوع للعلاج بحقن أبريلادا، قد يحتاج طفلك إلى العلاج من مرض السل أولاً قبل أن البدء في استخدام أبريلادا.

### التطعيمات:

قد يقترح طبيب طفلك أخذ تطعيمات معينة قبل البدء، لا ينبغي إعطاء اللقاحات الحية لطفلك أثناء استخدام Abrilada. إذا خضعت للعلاج بحقن أبريلادا أثناء الحمل، فمن المهم إخبار طبيب الطفل الصغير بذلك قبل أن يتلقى الطفل الصغير أي لقاح.

### أثناء العلاج باستخدام حقن أبريلادا

لضمان عمل أبريلادا بشكل صحيح وآمن لطفلك، يتوجب عليك مراجعة طبيبه بانتظام لمناقشة حالة طفلك، أخبر طبيبك على الفور عن أي تغييرات تطرأ على حالة طفلك.

**أبقى طبيب طفلك على علم بكيفية عمل أبريلادا من أجل سلامة طفلك.**

- اتصل بطبيب طفلك على الفور بشأن أي أعراض غير عادية قد يعاني منها طفلك، سيساعد هذا في ضمان حصول طفلك على الرعاية المناسبة، كما أنه سيقلل من فرصة تفاقم الآثار الجانبية.
- يمكن التعامل مع العديد من الآثار الجانبية- بما في ذلك الالتهابات- إذا أخبرت طبيب طفلك بها على الفور.
- إذا تعرض طفلك لأي أثر جانبي، سيقدر طبيب طفلك ما إذا كان ينبغي لطفلك أن يواصل أو يوقف علاجه باستخدام حقن أبريلادا، من المهم التحدث مع طبيب طفلك لمعرفة ما هو الأنسب له.
- نظرًا لأن الآثار الجانبية يمكن أن تحدث بعد آخر جرعة لطفلك من العلاج بدواء أبريلادا، أخبر طبيب طفلك عن أي مشاكل قد يعاني منها طفلك لمدة تصل إلى 70 يومًا بعد آخر حقنة لطفلك من Abrilada.

### أخبر طبيب طفلك عن:

- أي حالات طبية جديدة يعاني منها طفلك.
- الأدوية الجديدة التي سيتناولها طفلك.
- أي عملية جراحية مخطط أن يخضع لها طفلك.

قد يعاني بعض الأشخاص الذين يخضعون للعلاج باستخدام أبريلادا من آثار جانبية خطيرة، بما في ذلك:

### الالتهابات:

- تساعد حقن أبريلادا الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض الالتهابية عن طريق إحصار جزء من جهاز المناعة، ومع ذلك، فإن هذا الجزء من الجهاز المناعي يساعد أيضًا في مكافحة العدوى والالتهاب، وهذا يعني أن دواء أبريلادا يمكن أن يجعل طفلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والالتهاب، أو يجعل أي عدوى قد يعاني منها طفلك أكثر سوءًا، وهذا يشمل الالتهابات؛ مثل نزلات البرد أو الالتهابات الأكثر خطورة مثل السل.

### السرطان:

- في حال إعطاء طفلك حقنة أبريلادا، فقد يزداد خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطانات.

## مشاكل الجهاز العصبي:

• يعاني بعض الناس من مشاكل جديدة أو متفاقمة في الجهاز العصبي مع استخدام حقن أبريلادا، وهذا يشمل مرض التصلب المتعدد.

يُرجى قراءة نشرة أبريلادا للحصول على المزيد من المعلومات، فهذه ليست كل الآثار الجانبية المحتملة التي قد تحدث أثناء العلاج باستخدام أبريلادا.

اتصل بطبيب طفلك أو احصل على رعاية طبية فورية إذا كان طفلك يعاني من أي من الأعراض التالية لهذه الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة:

## الالتهابات:

• حمى، قشعريرة، تعرق، شعور بتوعك أو تعب أكثر من المعتاد، شعور بالمرض، إسهال، آلام المعدة، فقدان الشهية أو فقدان الوزن، السعال أو سعال الدم أو المخاط، ضيق التنفس، مشاكل التبول، تقرحات الجلد، آلام العضلات.

## مشاكل الجهاز العصبي:

• تنميل أو وخز، اضطرابات في الرؤية، ضعف عضلي، دوخة.

أخبر طبيب طفلك عن أي أعراض غير عادية قد يعاني منها طفلك أثناء العلاج باستخدام حقن أبريلادا، فهذه ليست جميع الأعراض المحتملة لهذه الآثار الجانبية.

معلومات تخصصك وتخصص أخصائي الرعاية الصحية المشاركين في رعاية أو علاج طفلك طبيًا.

## اختبارات السل وعلاجه:

ضع علامة على هذا المربع إذا كان طفلك قد خضع لأي فحص لمرض السل في أي وقت:

نعم (استشر طبيبك إذا كنت لا تعرف)

ضع علامة على هذا المربع كانت نتيجة فحص مرض السل لطفلك إيجابية:

نعم (استشر طبيبك إذا كنت لا تعرف)

ضع علامة على هذا المربع كان طفلك قد تناول أي حبوب لعلاج السل أو الوقاية منه:

نعم (استشر طبيبك إذا كنت لا تعرف)

يرجى قراءة نشرة أبريلادا للحصول على مزيد من المعلومات.

إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، فتحدث إلى طبيب طفلك أو أخصائي رعاية صحية آخر.

اسم طفلك:

اسم طبيب طفلك (الذي وصف لك علاج أبريلادا):

رقم هاتف طبيب طفلك:

دواعي الاستعمال:

تاريخ إعطاء طفلك حقنة أبريلادا الأولى:

جرعة حقنة أبريلادا المقدمة لطفلك:

تاريخ آخر حقنة أبريلادا مقدمة لطفلك (إذا لم يعد يُعطى حقن أبريلادا):

يرجى ملء المعلومات الخاصة بطفلك ومتخصصي الرعاية الصحية المشاركين في تقديم الرعاية الطبية لطفلك أو علاجه.

**للإبلاغ عن الأعراض الجانبية:**

المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية (NPC) بالهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA)

رقم مركز اتصال الهيئة العامة للغذاء والدواء: ١٩٩٩٩

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa

الموقع الإلكتروني: /http://ade.sfda.gov.sa

قسم التيقظ الدوائي في الشركة

البريد الإلكتروني: SAU.AEReporting@pfizer.com



فايزر السعودية المحدودة

الرياض - حي العقيق

مركز الملك عبدالله المالي ( كافد )

مبنى 4.07

الرمز البريدي 13519

تليفون: +966122293500

فاكس: +966122293692

هذه البطاقة معتمدة من الإدارة التنفيذية للتيقظ الدوائي في الهيئة العامة للغذاء والدواء.

للحصول على نسخ إضافية من بطاقة التذكير الخاصة بالمريض، يرجى إرسال رسالة تحتوي على بيانات الاتصال والعدد المطلوب إلى

عنوان البريد الإلكتروني SAU.AEReporting@Pfizer.com