

## فيروماكس معلومات هامة للمريض

### الهدف من هذه المادة التعليمية:

تعد هذه المادة التعليمية ضرورية وذلك لضمان الاستخدام الآمن والفعال للمنتج والقدرة على التحكم المناسب بالمخاطر الهامة المختارة.

حقن فيروماكس (على هيئة سكرور الحديد)

تحتوي هذه المادة التعليمية على معلومات هامة للمرضى حول المخاطر المحتملة للتفاعلات التحسسية الخطيرة مع فيروماكس أو أي علاج وريدي بالحديد (الحديد الذي يعطى عن طريق الحقن أو التسريب الوريدي) على هيئة سكرور الحديد.

يرجى قراءة هذه النشرة جيداً وفي حال كان لديك أية أسئلة تتعلق بهذا المستحضر، قم باستشارة طبيبك المعالج.

كما يرجى قراءة النشرة الدوائية الخاصة بالمريض المتوفرة مع مستحضر حقن الفيروماكس . حيث تحتوي على معلومات إضافية مهمة متعلقة بهذا المستحضر.

تستخدم حقن فيروماكس لعلاج نقص الحديد عندما لا يمكن للمريض استخدام مستحضرات الحديد عن طريق الفم أو إذا لم يحدث أي تحسن للحالة بعد تناول مستحضرات الحديد عن طريق الفم. يهدف هذا العلاج على تجديد مخزون الحديد في الجسم.

يمكن أن تسبب حقن الحديد تفاعلات تحسسية. ويمكن أن تصبح هذه التفاعلات خطيرة ومهددة للحياة (تعرف باسم التفاعلات الاستهدافية) عند عدد قليل من المرضى. كما يمكن أن تسبب مشاكل في القلب وضغط الدم و/أو الإغماء أو فقدان الوعي.

يجب عدم إعطائك فيروماكس في الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من الحساسية (فرط الحساسية) تجاه هذا الدواء أو تجاه أيًا من المكونات الأخرى في هذا الدواء.
- إذا كنت قد عانيت مسبقاً من حساسية خطيرة (فرط الحساسية) تجاه أيًا من مستحضرات الحديد الأخرى التي يتم إعطائها عن طريق الحقن.
- إذا كنت تعاني من ارتفاع مستوى الحديد في الجسم.
- إذا كنت تعاني من فقر الدم غير الناجم عن نقص الحديد.

يرجى منك إخبار طبيبك المعالج قبل أن يتم وصفك أو إعطائك فيروماكس إذا كان أيًا مما ذكر أعلاه ينطبق عليك.

♦ من الضروري أن تعلم أن التفاعلات التحسسية يمكن أن تحدث حتى وإن لم تحدث لك مشاكل في حقن الحديد سابقاً.

يمكن أن يكون لديك خطر متزايد للإصابة بالتفاعلات التحسسية إذا كنت تعاني من أي من الحالات التالية:

- إذا كان لديك حساسية معروفة، بما في ذلك الحساسية تجاه الأدوية.
- إذا كان لديك تاريخ سابق من داء الربو الشديد، الأكزيما أو أي من أنواع الحساسية الأخرى مثل الغبار، حبوب اللقاح أو من وبر الحيوانات الأليفة.
- إذا كنت تعاني من الالتهابات أو الاضطرابات المناعية مثل التهاب المفاصل الروماتيزمي أو الذئبة الحمامية.
- إذا كنت تعاني من اضطرابات في الكبد.

يرجى منك إخبار طبيبك المعالج قبل وصفك أو إعطائك حقن فيروماكس إذا كان أياً مما ذكر أعلاه ينطبق عليك. طبيبك المعالج سيقدر ما إذا كانت حقن الحديد مناسبة لك.

الحمل:

لا ينبغي استخدام فيروماكس أثناء الحمل إلا إذا كان ذلك ضرورياً. من الضروري إخبار طبيبك المعالج إذا كنت حاملاً، تعتقد أنك قد تكونين حاملاً، أو إذا كنت تخططين لذلك.

يرجى منك إخبار طبيبك المعالج للحصول على المشورة الطبية، إذا أصبحت حاملاً أثناء فترة تلقي العلاج. الطبيب المعالج هو من يقرر الاستمرار في العلاج أو وقفه.

يرجى منك إخبار طبيبك المعالج أو الصيدلي أو الممرض على الفور في الحالات التالية:

إذا ظهرت علامات أو أعراض التفاعلات التحسسية أثناء العلاج بحقن الحديد الوريدي أو بعدها بفترة قصيرة.

على سبيل المثال، حدوث طفح جلدي على شكل خلايا النحل، احمرار، الحكّة، الدوخة، الدوار، تورم الشفاه، اللسان، الحلق أو الجسم، صعوبة التنفس، ضيق التنفس أو الأزيز.

يدرك طبيبك وطاقم التمريض هذه التأثيرات الجانبية المحتملة، وستتم مراقبتك أثناء وبعد تلقي فيروماكس أو أي علاج بالحديد الوريدي.

الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية المشتبه بها:

يخضع هذا الدواء لمراقبة إضافية، سوف يساعد ذلك على تحديد معلومات السلامة الجديدة بصورة سريعة. يمكنك المساعدة عن طريق الإبلاغ عن أية تأثيرات جانبية يحتمل حدوثها.

يرجى منك التحدث إلى طبيبك المعالج أو الممرض، في حال حدوث أياً من التأثيرات الجانبية بما في ذلك أية تأثيرات جانبية يحتمل حدوثها ولم يتم ذكرها في هذه النشرة. كما يمكنك الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية مباشرة من خلال التواصل مع شركة الخليج للصناعات الدوائية – جلفار أو المركز الوطني للتبقيظ الدوائي والسلامة الدوائية:

للإبلاغ عن أي تأثيرات جانبية:

• المركز الوطني للتبقيظ الدوائي:

فاكس: +966-11-205-7662

مركز الاتصال: 19999

البريد الإلكتروني: [npc.drug@sfd.gov.sa](mailto:npc.drug@sfd.gov.sa)

الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfd.gov.sa>



• الخليج للصناعات الدوائية – جلفار

اتصل بشركة جلفار على الرقم: +96611 463 1299

البريد الإلكتروني: [medical.affairs@julphar.net](mailto:medical.affairs@julphar.net)

كما يمكنك الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية مباشرة عن طريق الرابط التالي او عن طريق QR Code:

<http://www.julphar.net/en/pharmacovigilance/how-do-i-report-an-adverse-reaction>

