

بطاقة المريض

احتفظ بهذه البطاقة معك (أو مع مقدم الرعاية) في جميع الأوقات

معلومات السلامة حول رينفوك (يوباداسيتينيب) للمرضى

- تحتوي هذه البطاقة على معلومات مهمة يجب أن تكون على دراية بها – قبل وأثناء العلاج برينفوك
- اقرأ نشرة المعلومات الخاصة بالمريض لمزيد من المعلومات

اسمك:

اسم الطبيب – الذي وصف لك رينفوك:

رقم الهاتف الخاص بالطبيب:

التاريخ الذي بدأت خلاله تناول رينفوك

إصدار 4.0 فبراير ٢٠٢٣
SA-RNQ-230003

أظهر هذه البطاقة لأي من اختصاصيي الرعاية الصحية المشاركين في رعايتك الطبية – على سبيل المثال، طبيب الأسنان أو طبيب الطوارئ

يمكنك تقديم المساعدة من خلال الاتصال بالبريد الإلكتروني:
PV.MEA@abbvie.com

الخط الساخن:
+966558282010 للإبلاغ عن أي آثار جانبية
للاتصال بالمركز الوطني للتيقظ – هيئة الغذاء والدواء السعودية
مركز الاتصال الموحد لهيئة الغذاء والدواء السعودية: 19999

الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfda.gov.sa/>
البريد الإلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa



خطر الإصابة بالسرطان

من المحتمل أن يزيد رينفوك من خطر إصابتك بالسرطان وخاصةً سرطان الجلد

أبلغ طبيبك في حال لاحظت أي تغيير في مظهر منطقة ما على جلدك، أو لاحظت أي نمو جديد على بشرتك

خطر الإصابة بثقب في أمعائك

قد يزيد رينفوك من خطر حدوث ثقب في أمعائك خاصةً إذا كنت مصاباً بمرض كرون. أخبر طبيبك على الفور إذا كنت تعاني من آلام غير مبررة أو غير متوقعة في المعدة

وسائل منع الحمل، والحمل والرضاعة الطبيعية

- ينبغي عليك عدم تناول رينفوك في أثناء الحمل
- ينبغي عليك استخدام وسائل منع حمل فعّالة في أثناء تناول رينفوك – ولمدة ٤ أسابيع بعد تناول جرعتك الأخيرة. تحدثي إلى طبيبك حول وسائل منع الحمل الفعّالة
 - أخبري طبيبك علم الفور إذا كنت تفكرين في الحمل أو إذا أصبحت حاملاً.
 - لا ترضعي طبيعياً أثناء استخدام رينفوك

خطر الإصابة بجلطات دموية في الأوردة أو الرئتين

تمت ملاحظة جلطات دموية في الأوردة أو الرئتين عند تناول رينفوك. أبلغ طبيبك علم الفور إذا ظهرت عليك علامات جلطات دموية في الأوردة أو الرئتين، مثل تورم مؤلم في الساقين، أو ضيق في التنفس أو ألم في الصدر

خطر الإصابة بمرض القلب

- يرتبط العلاج برينفوك بارتفاع في نسبة الكوليستيرول (دهون الدم) سيحقق طبيبك من مستويات الكوليستيرول لديك في أثناء تلقيك رينفوك
- أبلغ طبيبك علم الفور إذا لاحظت أعراضاً مثل ألم أو ضيق في الصدر نظراً لأن هذا قد يكون أحد أعراض مرض القلب

اللقاحات المُستخدمة للمساعدة في منع العدوى

- يجب عدم إعطاء اللقاحات الحية (علم سبيل المثال، لقاح الإنفلونزا من خلال بخاخ الأنف، ولقاح جدرمي الماء، والحصبة/التهاب الغدة النكافية/الحصبة الألمانية) في أثناء العلاج برينفوك، أو قبل بدء العلاج برينفوك مباشرة
- قبل تلقي أي لقاحات، تحدّثي إلى طبيبك – إذ سيكون علم علم باللقاحات التي يجب ألا تتلقاها قبل أو في أثناء العلاج برينفوك

خطر الإصابة بالعدوى

- قد يؤدي رينفوك إلى تفاقم العدوى الموجودة لديك أو يزيد من فرصة إصابتك بعدوى جديدة – علم سبيل المثال، السل، أو الهربس المنطقي أو التهاب الكبد الفيروسي.
- أخبر طبيبك علم الفور إذا لاحظت ظهور علامات العدوى عليك، مثل:
- الحمى، أو التعرق، أو القشعريرة، أو فقدان الوزن أو السعال الذي لا ينتهي – قد تكون تلك علامات علم مرض السل.
 - طفح جلدي مؤلم مع ظهور بثور – قد يكون هذا علامة علم الهربس المنطقي.
 - الشعور بالتعب أو ضيق التنفس – قد يكون هذا علامة علم الالتهاب الرئوي.

Risk of cancers

RINVOQ® may potentially increase your risk of developing cancers particularly skin cancer.

Let your doctor know if you notice any change in the appearance of an area on your skin, or notice any new growth on your skin.

Risk of a hole in your bowel

RINVOQ® may increase your risk of a hole in your bowel especially if you have Crohn's disease. Tell your doctor straight away if you have unexplained or unexpected stomach pain.

Show this card to any healthcare professional involved in your medical care – for example, your dentist or an emergency doctor.

You can help by contacting
PV.MEA@abbvie.com or +966558282010
to report any side effects.

National Pharmacovigilance Center Saudi Food and
Drug Authority
SFDA Unified Call Center: 19999
E-mail: npc.drug@sfd.gov.sa
Website: <https://ade.sfda.gov.sa/>



Your name:

Consultant's name – who prescribed RINVOQ®:

Consultant's phone number:

The date you started RINVOQ®:

Version 4.0. February 2023.
SA-RNQ-230003

Patient Card

Keep this card with you (or caregiver) all the time

Safety Information about RINVOQ® (upadacitinib) for patients

- This card contains important safety information you should be aware of – before and during treatment with RINVOQ®.
- Read the patient information leaflet for more information.

Risk of infections

RINVOQ® may make an existing infection worse or increase the chance of you getting a new infection – for example tuberculosis, shingles or viral hepatitis.

Tell your doctor straight away if you notice signs of infection, such as:

- Fever, sweating, chills, weight loss, or a cough that won't go away – these may be signs of tuberculosis.
- Painful skin rash with blisters – this may be a sign of shingles.
- Feeling tired or short of breath – this may be a sign of pneumonia.

Vaccines – used to help prevent infections

Live vaccines (for example influenza vaccine by nasal spray, varicella, measles/mumps/rubella) should not be given during RINVOQ® treatment, or just before starting RINVOQ® treatment.

Before being given any vaccines, talk to your doctor – they will know which vaccines you should not be given before or during treatment with RINVOQ®.

Risk of heart disease

Treatment with RINVOQ® was associated with increases in cholesterol (blood fat). Your doctor will check your cholesterol levels while you are taking RINVOQ®.

Tell your doctor straight away if you notice symptoms such as chest pain or tightness since this may be a symptom of heart disease.

Contraception, pregnancy, and breast-feeding

RINVOQ® must not be taken during pregnancy.

- Use effective contraception while taking RINVOQ® – and for 4 weeks after your last dose. Talk to your doctor about effective contraception.
- Tell your doctor straight away if you wish to become pregnant, or if you become pregnant.
- Do not breast-feed while using RINVOQ®.

Risk of blood clots in veins or lungs

Blood clots in veins or lungs have been observed with RINVOQ®. Tell your doctor straight away if you get signs of blood clots in veins or lungs, such as a painful swollen leg, shortness of breath, or chest pain.