

بطاقة عقار ليكفيو (إنكليسيران)

تهدف هذه البطاقة إلى مساعدة مرضاك على التخطيط
وتتبع جرعتي عقار ليكفيو (إنكليسيران) سنوياً *

أعطِ هذه البطاقة لمرضاك عندما يتلقون أول جرعة من عقار ليكفيو
(إنكليسيران) ثم قُم بالتالي:

- * قُم بوضع علامة علي المربعات المقابلة للجرعات عند تلقيها من قِبَل مرضاك
- * قُم بتحديد وكتابة موعدهم التالي
- * استخدم زياراتهم الروتينية كفرصة لتتبع الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة
- * قُم بتذكير مرضاك بإحضار هذه الشهادة في موعدهم التالي



* عقار ليكفيو (إنكليسيران) هو حقنة يعطيها مقدم الرعاية الصحية في العيادة في المواعيد التالية: الجرعة الأولية، ثم مجددًا بعد مرور 3 أشهر، ومن ثم تعطي مرة واحدة كل 6 أشهر

بطاقة تذكير بالجرعات

خفض الكوليسترول الضار (كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة) والحفاظ عليه منخفضًا!

اسمي: _____

معلومات الاتصال بطيبي:

الاسم: _____

العنوان: _____

الهاتف: _____

البريد الإلكتروني: _____

يُمكن إدراج جرعتك اللتين تتلقاهما سنويًا من عقار ليكفيو®
بسهولة ضمن فحصك الروتيني المُعتاد*

*عقار ليكفيو هو حقنة يعطيها مقدم الرعاية الصحية في العيادة في المواعيد التالية: الجرعة الأولى، ثم مُجددًا بعد مرور ٣ أشهر، ومن ثم تُعطى مرة واحدة كل ٦ أشهر.

متابعة سير العلاج بعقار ليكفيو®: متى يلزمني تلقي جرعتي التالية؟

يشمل عامك الأول من العلاج بعقار ليكفيو ٣ جرعات:
الجرعة الأولى ستلتاها اليوم، والجرعة الثانية ستلتاها
بعد ٣ أشهر، والجرعة الثالثة ستلتاها بعد ٩ أشهر
من الآن. بعد ذلك، ستلقى عقار ليكفيو كل ٦ أشهر.
استشر طبيبك إذا كانت لديك أية أسئلة أو مخاوف
بشأن جدول جرعاتك.



عامي الأول من العلاج بعقار ليكفيو®

□ الجرعة ١

انتهيت من تلقي الجرعة
الأولى، أحسنت صنفا!

موعدتي هو: _____
مستوى كوليسترول البروتين
الدهني منخفض الكثافة لدي: _____

□ الجرعة ٢

#١٢ لم يتبق سوى جرعة
واحدة أخرى هذا العام!

موعدتي هو: _____
مستوى كوليسترول البروتين
الدهني منخفض الكثافة لدي: _____

□ الجرعة ٣

هنيئاً لك إتمامك العام الأول
من العلاج بعقار ليكفيو

موعدتي هو: _____
مستوى كوليسترول البروتين
الدهني منخفض الكثافة لدي: _____

بعد تلقيك الجرعة الثانية:

إذا تغيبت عن موعد تلقي عقار ليكفيو،
فاتصل بالطبيب أو مقدم الرعاية الصحية
الخاص بك حالما تتذكر؛ كي تتمكن من
تحديد موعد لتلقي علاجك التالي.



جرعتان سنوياً

.LDL-C testing is subject to HCP's decision

عامي الثاني

□ الجرعة ٤

موعدِي هو: _____
مستوى كولسترول البروتين
الدهني منخفض الكثافة لدي: _____
بدء العام الثاني على
نحو صحيحا

□ الجرعة ٥

موعدِي هو: _____
مستوى كولسترول البروتين
الدهني منخفض الكثافة لدي: _____
نراك العام
القادم!

عامي الثالث

□ الجرعة ٦

موعدِي هو: _____
مستوى كولسترول البروتين
الدهني منخفض الكثافة لدي: _____
تلقيت واحدة ولم يتبق
سوى واحدة أخرى هذا
العام!

□ الجرعة ٧

موعدِي هو: _____
مستوى كولسترول البروتين
الدهني منخفض الكثافة لدي: _____
الموفق #٧
✓ ✓ ✓

استمر كالعادة في تلقي العلاج بالاستاتينات على النحو الذي وصفه لك طبيبك وانتِظِم في تلقي عقار ليكفيو® وفقًا لجدول جرعاتك!

إذا كنت بحاجة إلى إعادة تحديد موعدك، فأُعَلِّم طبيبك أن زيارتك تشمل تلقي حقنة. ستتمكن بذلك من الحفاظ على الفواصل الزمنية الصحيحة الخاصة بالجرعات.

عامي الرابع

□ الجرعة ٨

موعدِي هو: _____
مستوى كوليسترول البروتين
الدهني منخفض الكثافة لدي: _____
مرحبًا بك في العام
الرابع!

□ الجرعة ٩

موعدِي هو: _____
مستوى كوليسترول البروتين
الدهني منخفض الكثافة لدي: _____
مبارك، الجرعة
١٠ هي التَّالية!

عامي الخامس

□ الجرعة ١٠

موعدِي هو: _____
مستوى كوليسترول البروتين
الدهني منخفض الكثافة لدي: _____
الجرعات تتجاوز العشرة،
أحسنت!

□ الجرعة ١١

موعدِي هو: _____
مستوى كوليسترول البروتين
الدهني منخفض الكثافة لدي: _____
لقد فعلتها!
استمرا

تهانينا! اطلب من طبيبك تصريحًا جديدًا لعقار ليكفيو® واحصل
على جرعتك التَّالية بعد مرور ٦ أشهر.

بإمكان التغييرات البسيطة التي تجربها على خياراتك الغذائية وروتين
أنشطتك البدنية مساعدتك على خفض مستوى الكوليسترول
الضار (كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة) أكثر! يُرجى
استشارة طبيبك.



قبل مغادرة عيادة طبيبك، تأكد من تحديد موعدك التَّالي وجرتك التَّالية من عقار ليكفيو®!

معلومات هامة خاصة بالأمان

١. ما هو عقار ليكفيو®؟ وفيم يُستخدَم؟

ما هو عقار ليكفيو®؟ يحتوي عقار ليكفيو على المادة الفعَّالة إنكليسيران، وهي عبارة عن حمض نووي ربيبي متداخل صغير ثنائي السلسلة يعمل على خفض الكوليسترول.

دواعي استعمال عقار ليكفيو

يُستخدَم عقار ليكفيو بجانب نظام غذائي خافض للكوليسترول لخفض الكوليسترول إذا كنت بالغًا وتعاني من ارتفاع مستوى الكوليسترول، بالذَّم (المعروف أيضًا بـ"فرط دهون الدَّم الأولي" إما في ذلك فرط كوليسترول الدَّم العائلي متمثلًا بالجينات).

يُغطى العقار بجانب أدوية أخرى خافضة للكوليسترول، مثل الستاتينات (أدوية شائعة الاستخدام لعلاج ارتفاع الكوليسترول).

كيف يعمل عقار ليكفيو؟

يستخدم إنكليسيران إحدى عمليات الجسم الطبيعية لخفض الكوليسترول «الضار» (الفسْفِي أيضًا بـكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة). يعمل العقار عن طريق الحد من إنتاج بروتين يُدعى PCSK9 (كونفيرتاز البروتين الأولي سيتيليرين/كبيكسن من النوع ٩)؛ والذي قد يزيد مستويات الكوليسترول «الضار» من خلال منع إنتاج هذا البروتين، بإمكان عقار ليكفيو خفض مستويات الكوليسترول «الضار» في جسمك.

إذا كانت لديك أية أسئلة حول كيفية عمل عقار ليكفيو أو لماذا وُصف لك هذا الدواء، فاستشر طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية.

٢. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل وأثناء تلقي عقار ليكفيو؟

يُرجى اتباع تعليمات طبيبك كاملةً بدقة؛ فقد تختلف المعلومات العامة الواردة في هذه النُشرة.

لا تتلقَّ عقار ليكفيو في الحالات الآتية:

• إذا عانيت سابقًا من تفاعل حساسية تجاه إنكليسيران أو تجاه أي مكون آخر من مكونات هذا المنتج (الفردجة في قسم ٢). إذا كنت تعتقد أنك قد تكون لديك حساسية، فاستشر طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

الأطفال والمراهقون (تحت سن ١٨ عاماً)

لا يجب استخدام عقار ليكفيو في الأطفال والمراهقين الأقل من ١٨ سنة.

المرضى من كبار السن (بفقر ٦٥ عامًا فأكثر)

يمكنك استخدام عقار ليكفيو® إذا كنت تبلغ من العمر ٦٥ عامًا فأكثر بالجرعة نفسها المُخصصة للبالغين.

تناول أدوية أخرى (التداخلات الدوائية مع المنتجات الدوائية الأخرى من ضمنها اللقاحات أو المستحضرات الحيوية)

يُرجى إبلاغ طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تستخدم أو استخدمت مؤخرًا أو قد تستخدم أية أدوية أخرى بما فيها الأدوية التي تحصل عليها دون وصفة طبية.

الحمل والرضاعة الطبيعية

إذا كنت حاملًا أو مرضعًا، أو تعتقدن أنك قد تكونين حاملًا أو تخططين لذلك، فاستشري طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل استخدام هذا الدواء.

٣. كيفية تلقي عقار ليكفيو

يُعطى عقار ليكفيو في هيئة حُقن أسفل الجلد في منطقة البطن. سيعطيك إياه طبيب أو مقدم رعاية صحية. قبل بدء استخدام عقار ليكفيو، ينبغي أن تتبع نظامًا غذائيًا لخفض مستوى الكوليسترول، ومن المُرجح أنك ستتناول أحد الستاتينات (دواء شائع الاستخدام لعلاج ارتفاع مستوى الكوليسترول). ينبغي أن تظل متيقًا لهذا النظام الغذائي الخافض للكوليسترول، وأن تستمر في تناول الستاتين طيلة فترة تلقيك عقار ليكفيو.

ما الكمية التي ينبغي تلقيها من عقار ليكفيو؟

تبلغ الجرعة المُوصى بها ٢٨٤ مجم من عقار ليكفيو تُعطى على هيئة حقنة واحدة أسفل الجلد؛ في البداية، ثم مرة أخرى بعد انقضاء ٣ أشهر، ثم كل ٦ أشهر.

إذا تلقيت كمية أكبر مما يجب من عقار ليكفيو

سيعطيك طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك هذا الدواء. في حال تم إعطاؤك كمية أكبر من اللازم، وهو أمر مستبعد للغاية، فسيُفحصك طبيبك تحسبًا لإصابتك بآثار جانبية.

إذا أُنفلت تلقي الجرعة الخاصة بك من عقار ليكفيو

إذا نسيبت عن موعد تلقي عقار ليكفيو، فامنصل بالطبيب أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حالما تتذكر؛ كي تتمكن من تحديد الموعد التالي لتلقي علاجتك.

إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية عن استخدام هذا الدواء، فاستشر طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

٤. الآثار الجانبية المُحتملة

كما هو الحال مع كافة الأدوية، قد يتعرَّض المرضى الذين يُعالجون بعقار ليكفيو لآثار جانبية، على الرِّغم من عدم حدوثها لدى الجميع.

يُرجى إبلاغ الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا لاحظت أيًا من الآثار الجانبية التَّالية أو إذا أصبحت تلك الآثار الجانبية شديدة.

شائعة: قد تؤثر على ما يصل إلى ١ من بين كل ١٠ أشخاص

• تفاعلات بموضع الحقن، مثل الألم، الاحمرار أو الطخح الجلدي.

إذا لاحظت أية آثار جانبية غير واردة في هذه النُشرة، فيُرجى إبلاغ طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

يمكنك الإبلاغ عن أي أعراض جانبية أو شكاوى أو لطلب نسخ إضافية من خلال:

شركة نوفارتس - السعودية - قسم سلامة المرضى :

الرقم المجاني: 8001240078

الهاتف: ٠٠٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٠

الفاكس: ٠٠٩٦٦١١٢٦٥٨١٠٧

الايمل: adverse.events@novartis.com

أو عن طريق الإنترنت: <https://>

www.report.novartis.com/ar

الهيئة العامة للغذاء والدواء, المركز الوطني للتبقيط الدوائي :

مركز الاتصال الموحد: 19999

الفاكس: +966112057662

الايمل: npc.drug@sfd.gov.sa

أو عن طريق الإنترنت: <https://ade.sfda.gov.sa/>