

معلومات مهمة عن سلامة الدواء

بطاقة المريض

تيريفلونومايد بي او اس

أقراص تيريفلونومايد 14 مغ

أقراص تيريفلونومايد 7 مغ

توفر بطاقة المريض هذه معلومات مهمة حول أخطار مادة تيريفلونومايد.

يرجى إبراز هذه البطاقة لأي طبيب أو أخصائي رعاية صحية مشارك في رعايتك الطبية (على سبيل المثال في حالة الطوارئ). يجب عليك أيضاً قراءة نشرة معلومات المريض لمزيد من المعلومات.

يرجى ملء القسم أدناه أو اطلب من طبيبك القيام بذلك

اسم المريض	
تاريخ الميلاد	
تاريخ وصف تيريفلونومايد لأول مرة	
المستشفى	
اسم الطبيب	
هاتف الطبيب	

أعراض جانبية مهمة

يقلل تيريفلونومايد من نشاط الجهاز المناعي. في بعض الأشخاص، يمكن أن يسبب تيريفلونومايد تلف الكبد (التهاب الكبد) وقد يقلل أيضاً من إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدوى (العدلات) والصفائح الدموية التي تشارك في تخثر الدم. يجب فحص وظائف الكبد وضغط الدم بانتظام أثناء العلاج بتيريفلونومايد، ويجب إجراء فحص لصورة الدم إذا لزم الأمر. يجب أيضاً إجراء هذه الاختبارات قبل بدء العلاج.

إذا كان لديك أي من الآثار الجانبية التالية، يرجى الاتصال بطبيبك على الفور:

- اصفرار الجلد أو اصفرار بياض العين (اليرقان)، غثيان أو قيء غير مبرر، ألم في البطن، أو بول أغمق من المعتاد. هذه هي أعراض مشاكل الكبد.
- علامات العدوى بما في ذلك، ألم عند التبول، والتشوش، وارتفاع درجة الحرارة (الحى)، والسعال.

للنساء في سن الإنجاب بما في ذلك الفتيات وأبائهن / مقدمو الرعاية

- لا ينبغي استخدام تيريفلونومايد أثناء الحمل أو في النساء في سن الإنجاب إذا لم تكن تستخدم وسائل منع حمل فعالة لأنها يمكن أن تسبب تشوهات خلقية خطيرة.
- لا تأخذ دواء تيريفلونومايد عندما تكونين حاملاً أو تعتقد أنك حامل. قد يطلب منك طبيبك إجراء اختبار الحمل للتأكد.
- يجب استخدام وسائل منع الحمل الفعالة أثناء وبعد العلاج بتيريفلونومايد حتى تنخفض مستويات الدواء في الدم. سيقدّم طبيبك المشورة بشأن المخاطر المحتملة على الجنين والحاجة إلى وسائل منع الحمل الفعالة.

- أخبري طبيبك إذا كنت ترغبين في تغيير طريقة منع الحمل أو التخطيط للحمل بعد التوقف عن العلاج بتيريفلونومايد. يجب عليك أيضاً مناقشة الأمر مع طبيبك إذا كنت تخططين للرضاعة الطبيعية أو إذا كنت ترضعين طفلك.
- إذا كنت تشكين في أنك حامل أثناء تناول تيريفلونومايد أو في غضون عامين بعد توقفك عن العلاج، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور لإجراء اختبار الحمل. إذا أكد الاختبار أنك حامل، فقد يقترح طبيبك العلاج بأدوية معينة لتسريع إزالة مادة تيريفلونومايد من جسمك، لأن هذا قد يقلل من المخاطر على طفلك.
- يجب على الآباء أو القائمين على رعايتهم الاتصال بطبيب ابنتهم عندما تأتي الدورة الشهرية الأولى حتى يتم نصحتها بشأن أخطار العيوب الخلقية أثناء الحمل وتقديم المشورة بشأن وسائل منع الحمل المناسبة.

التبليغ عن الأعراض الجانبية:

إذا عانيت من أي آثار جانبية، فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة. يشمل ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في النشرة.

يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة عن طريق التواصل مع:

بوسطن اونكولوجي العربية المحدودة

رقم: +966 5352 48819

البريد الإلكتروني: pv@bostononcology.com

طريق الملك عبدالعزيز، 11562

الرياض، المملكة العربية السعودية

مركز التيقظ الدوائي الوطني (NPC)

رقم هيئة الغذاء والدواء السعودية: 19999

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa

موقع الشبكة: <https://ade.sfd.gov.sa/>

من خلال الإبلاغ عن التأثيرات الجانبية، يمكنك المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

المراجع:

1. نشرة معلومات المريض لمستحضر Teriflunomide BOS.

2. دليل التعليم/ المناقشة المهنية للرعاية الصحية لمستحضر Teriflunomide

Medicines.org.uk. [cited 20 October 2021]. Available from: <https://www.medicines.org.uk/emc/rmm/292/Document>.