

البطاقة التنبيهية للمريض "برادكسا"

Boehringer Ingelheim Middle East, Turkey, and Africa Regional Operating Unit
PO. Box 505123, Dubai Healthcare City, Dubai, United Arab Emirates
Website: www.boehringer-ingelheim.com/mena/
Tel: +971 4 4230400 Fax: +971 4 4233637

- الرجاء حمل هذه البطاقة معك في جميع الأوقات للإبلاغ عن الأعراض الجانبية الرجاء الإتصال بالادارة التنفيذية للتبليغ وإدارة الامتثال
تلفون: 00966-11-2038222
تحويل: 2334 , 2340, 2354 , 2317 , 2356 , 2353
الهاتف المجاني : 8002490000
فاكس: 00966-11-2057662
البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa
للإبلاغ عن الأعراض الجانبية الخاصة بمستحضرات شركة بوهرنجر إنجلهايم الرجاء الإتصال بمركز التبليغ الدوائي لشركة بوهرنجر إنجلهايم
هاتف: 00966-11-2078275
البريد الإلكتروني: PV local Saudi Arabia@boehringer-ingelheim.com



عزيزي المريض

لقد بدأ طبيبك علاجك بعقار "برادكسا"، و من أجل استعمال آمن للعقار الرجاء الأخذ في الاعتبار هذه المعلومات الهامة الموجودة بالداخل .

بما أن هذه البطاقة التنبيهية للمريض تحتوي على معلومات هامة عن العلاج الخاص بك، الرجاء حمل هذه البطاقة معك في جميع الأوقات لتبلغ مختصي الإهتمام بالصحة عن تناولك لعقار "برادكسا".



معلومات للمرضى عن عقار "برادكسا"

- إتبع تعليمات طبيبك عند أخذك عقار "برادكسا".
- يقوم "برادكسا" بمنع تجلط الدم لجعل الدم أقل لزوجة، ومن المحتمل أن يزيد هذا من مخاطر حدوث نزيف .
- قم بإبلاغ طبيبك على الفور في حالة حدوث نزيف للدم و عدم توقفه تلقائياً .
- إذا سقطت أو أصبت نفسك أثناء العلاج، خاصة أديت إلى إصابة رأسك، فيرجى طلب العناية الطبية العاجلة. قد تحتاج للفحص بواسطة الطبيب، لأنك قد تكون معرضاً لارتفاع خطر حدوث نزيف.
- بما أن "برادكسا" يعمل على نظام تجلط الدم، فمعظم التأثيرات الجانبية متعلقة بمؤشرات حدوث نزيف، ومن علامات أو آثار حدوث نزيف تحول لون الجلد إلى الأزرق و تغير لون البراز إلى الأسود و وجود دم في البول و نزيف في الأنف.
- إذا إستدعى الأمر إلى تدخل جراحي نرجو إبلاغ طبيبك المعالج عن تناولك لعقار "برادكسا".
- لا توقف تناولك لعقار "برادكسا" بدون إخبار طبيبك حتى لا تتعرض للإصابة بمخاطر حدوث جلطات.
- في حالة الإصابة بنزيف الدم الرجاء الإتصال بطبيبك قبل توقفك عن إستخدام "برادكسا".
- تناول برادكسا بانتظام كما هو موصوف لك و لا تفوت الجرعة الدوائية.

- يجب إخبار الطبيب على جميع الأدوية التي تتناولها.
- يمكن تناول دواء "برادكسا" مع الطعام أو بدونة. يجب بلع الكبسولة كاملة بكمية من الماء. لا تقوم بتكسير الحبيبات أو مضغها أو تفرغها من الكبسولة فقد يزيد هذا من خطورة النزيف.

معلومات عن "برادكسا" للمختصين بالصحة:

- "برادكسا" مضاد للتجلط يؤخذ عن طريق الفم, يعمل عن طريق تثبيط الثرمبين و يتم إخراجها من الجسم عن طريق الكلى.
- في حالة التدخل الجراحي يجب وقف عقار "برادكسا" (لمعلومات إضافية إنظر ملخص خصائص الدواء).
- في حالة حدوث نزيف شديد يجب وقف عقار "برادكسا" فوراً .

- بما أن عقار "برادكسا" يتم إخراجها عن طريق الكلى فيجب أخذ كميات كافية من مدرات للبول. "برادكسا" قابل للإخراج عن طريق الغسيل الكلوي, و لكن لم يتم عمل تجارب كافية على ذلك, و لعكس التأثير الدوائي لسيولة الدم إنظر ملخص خصائص الدواء.

أطلب من طبيبك ملئ الجهة الخلفية من البطاقة

بيانات المريض

اسم المريض

تاريخ الميلاد

دواعي الاستعمال

جرعة برادكسا