

جدول مواعيد

يرجى استعمال هذا الجدول لتسجيل تواريخ مواعيدك مع طبيبك:

اسم الطبيب:

رقم الهاتف:

توقيع الطبيب	نتيجة اختبار الحمل	وسيلة منع الحمل المستعملة	تاريخ الموعد
	<input type="checkbox"/> إيجابية <input type="checkbox"/> سلبية التاريخ:		
	<input type="checkbox"/> إيجابية <input type="checkbox"/> سلبية التاريخ:		
	<input type="checkbox"/> إيجابية <input type="checkbox"/> سلبية التاريخ:		
	<input type="checkbox"/> إيجابية <input type="checkbox"/> سلبية التاريخ:		
	<input type="checkbox"/> إيجابية <input type="checkbox"/> سلبية التاريخ:		
	<input type="checkbox"/> إيجابية <input type="checkbox"/> سلبية التاريخ:		
	<input type="checkbox"/> إيجابية <input type="checkbox"/> سلبية التاريخ:		

يمكنك الإفادة عن أي هاجس مرتبط بسلامة استعمال كيوراكني CURACNE عبر الاتصال ببيير فاير على: RAPMS@tamergroup.com

يمكنك أيضا الإبلاغ عن أي رد فعل سلبي مشتبه به على مركز الوطني للتبليغ (NPC):



- المركز الموحد للهيئة العامة للغذاء والدواء: 19999
- البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.a.gov.sa
- الموقع الإلكتروني: <http://ade.sfd.a.gov.sa/>
- رمز الاستجابة السريعة:

لنسخات إضافية يرجى الاتصال ببيير فاير على: RAPMS@tamergroup.com

بطاقة تذكير للمريض (بما في ذلك جدول مواعيد)

بطاقة تذكير للمريض

اسم الطبيب:

رقم الهاتف:

تمت الموافقة على هذه الوثيقة من قبل الإدارة التنفيذية للتيقظ الدوائي في الهيئة العامة للغذاء والدواء

لا يجب تناول كيوراكني CURACNE في خلال الحمل.

من الممكن أن يتسبب كيوراكني CURACNE بأذية الجنين إن تناولته امرأة حامل.

إن أصبحت حاملاً أو تعتقدين أنك قد تكونين حاملاً، توقفي عن تناول كيوراكني CURACNE فوراً واتصلي بطبيبك.

اقرأ منشور علبة كيوراكني CURACNE جيداً قبل البدء بالعلاج.

إن راودتك أي أسئلة أو هواجس عن تناول كيوراكني CURACNE، تكلمي مع طبيبك أو الصيدلاني الخاص بك.

ماذا عليك أن تفعلي إن كان من الممكن أن تصبحي حاملاً:

- عليك على الأقل استعمال وسيلة واحدة لمنع الحمل فعالة للغاية (كإدخال جهاز لمنع الحمل داخل الرحم أو زراعة وسيلة لمنع الحمل تحت الجلد) أو استعمال بشكل صحيح وسيلتين حبوب منع حبوب منع الحمل فعالتين لمنع الحمل تعملان بطرق مختلفة (كوسيلة حبوب منع الحمل مع واقٍ جنسي) قبل العلاج، وفي خلاله، ولمدة شهر (1) بعد إيقافه.
- لا يجب أن تصبحي حاملاً بينما تتناولين كيوراكني CURACNE ، أو طوال شهر (1) بعد إيقاف العلاج.
- يجب أن تقومي بزيارات متابعة واختبارات حمل دورية:
 - قبل البدء بالعلاج، يجب أن تقومي باختبار حمل، تكون نتيجته سلبية.
 - للتأكد من أنك لست حاملاً في خلال العلاج، يجب أن تقومي باختبارات حمل دورية، والحالة المثلى أن تقومي بالاختبار كل شهر. ويجب أن تقومي باختبار حمل أخير بعد شهر (1) من إيقاف العلاج.

تذكير للرجال والنساء

وُصف هذا الدواء لكم ولكن فقط، لا تشاركونه/تشاركه مع أي كان وأعيدوا/أعدن أي كبسولات غير مستعملة إلى الصيدلية.

يجب أن لا تتبرع بالدم أثناء العلاج بكيوراكني CURACNE و لمدة شهر بعد إنتهاء العلاج بسبب الخطر المحتمل على جنين متلقية نقل الدم الحامل.