

تفاصيل الاتصال المهمة

اسمي:

تفاصيل الاتصال بالشخص الذي يمكن الاتصال به عند الطوارئ (اسمه ورقم هاتفه):

اسم الطبيب - الذي وصف عقار فينكليستا® (فينيتوكلاكس):

رقم هاتف الاتصال بالطبيب:

المعلومات المهمة للسلامة لأخصائيي الرعاية الصحية عن عقار فينكليستا® (فينيتوكلاكس) ومتلازمة انحلال الورم



يتناول هذا المريض عقار فينكليستا® (فينيتوكلاكس) لعلاج سرطان الدّم الليمفاوي المزمن الذي قد يسبب متلازمة انحلال الورم في أول 5 أسابيع من العلاج.

- ✓ احرص على تقييم عناصر كيمياء الدم: البوتاسيوم وحمض اليوريك والفوسفور والكالسيوم والكرياتينين.
- ✓ عالج على الفور اختلالات عناصر كيمياء الدم لإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية. فقد تؤدي إلى الوفاة إن لم تُعالج.
- ✓ إذا اشتبهت في أن المريض قد أصيب بمتلازمة انحلال الورم، فاتصل بالطبيب الذي وصف له هذا العقار والمدونة تفاصيله في هذه البطاقة فورًا.



يمكنك الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرةً بالاتصال بشركه أبفي بايوفارماسيوتيكالس جي إم بي إتش عبر البريد الإلكتروني: PV.MEA@abbvie.com أو عبر الخط الساخن: 00966 55 828 2010 أو المركز الوطني للتبليغ npc.drug@sfd.gov.sa، الموقع الإلكتروني: <https://ade.sfd.gov.sa/>.

تمت الموافقة على هذه الوثيقة من قبل الإدارة التنفيذية للتبليغ الدوائي في الهيئة العامة للغذاء والدواء

بطاقة المريض

معلومات مهمة حول عقار فينكليستا® (فينيتوكلاكس) لمرضى سرطان الدّم الليمفاوي المزمن.

يُستخدم عقار فينكليستا® (فينيتوكلاكس) لعلاج مرضى سرطان الدّم الليمفاوي المزمن. تحتوي هذه البطاقة على معلومات تلزمك معرفتها بخصوص متلازمة انحلال الورم وعقار فينكليستا® (فينيتوكلاكس).

- يُرجى الاحتفاظ ببطاقة المريض هذه معك دائمًا.
- أظهر هذه البطاقة لأي طبيب مُشارك في رعايتك الطبية أو إذا ذهبت إلى قسم الطوارئ.
- تناول دائمًا عقار فينكليستا® (فينيتوكلاكس) كما أخبرك طبيبك بالضبط.



ما الذي ينبغي لي معرفته بشأن متلازمة انحلال الورم؟

خلال فترة علاجك، قد ترتفع في دمك مستويات أملاح معينة من أملاح الجسم (مثل البوتاسيوم وحمض اليوريك). وقد يتسبب ذلك في إصابتك بحالة مرضية تُسمى متلازمة انحلال الورم خلال أول 5 أسابيع من العلاج.

أعراض متلازمة انحلال الورم:

- حمى أو قشعريرة
- غثيان أو قيء
- شعور بالارتباك
- شعور بضيق التنفس
- عدم انتظام ضربات القلب
- بول غَكر أو داكن
- شعور بتعب على نحو غير معتاد
- ألم بالعضلات أو المفاصل
- نوبات تشنّج أو صرع
- انتفاخ وألم بالبطن

ماذا أفعل إذا أصبت بأعراض متلازمة انحلال الورم؟

إذا أصيبت بأيٍّ من أعراض متلازمة انحلال الورم خلال فترة علاجك، فيجب عليك فعل ما يلي:

الاتصال بالطبيب أو طلب العناية الطبية فورًا، و 

توقف عن تناول عقار فينكليستا® (فينيتوكلاكس) 

اقرأ نشرة معلومات المريض للحصول على مزيد من المعلومات.

كيف يمكنني خفض احتمالية الإصابة بمتلازمة انحلال الورم؟

اشرب لترًا ونصف لتر إلى لترين من الماء يوميًا:

✓ قبل أن تتناول أول جرعة بيومين، و

✓ في اليوم الذي تتناول فيه أول جرعة، و

✓ كل يوم خلال أول 5 أسابيع من العلاج.

شرب الماء كثيرًا يساهم في إخراج أملاح الدم ذات المستويات المرتفعة في البول.

احضر- في مواعيد اختبارات الدم المقررة فمن خلالها يستطيع الطبيب تحديد الإصابة بمتلازمة انحلال الورم من عدمها.

قبل الخضوع للعلاج بعقار فينكلليكستا® (فينيتوكلاكس) ، ابدأ في تناول دواء آخر يعمل على منع تراكم أملاح الدم (حمض اليوريك) في الدم، وفقًا لتعليمات الطبيب.

