

اسمك:

اسم الطبيب (الذي وصف ليتفولو):

رقم هاتف الطبيب:

التاريخ الذي بدأت فيه ليتفولو:

معلومات السلامة للمرضى حول ليتفولو:

- هذه البطاقة تحتوي على معلومات أمان مهمة يجب أن تكون على علم بها قبل وأثناء العلاج باستخدام ليتفولو.
- لمزيد من المعلومات، اقرأ نشرة معلومات المريض المدرجة في كل عبة من ليتفولو.
- اسأل طبيبك أو الصيدلي إذا كانت أي من المعلومات غير واضحة.

احتفظ بهذه البطاقة معك، و قم بإظهارها لأي أخصائي رعاية صحية يشارك في رعايتك الطبية - على سبيل المثال؛ الصيدلي أو طبيب الطوارئ.

ما هو ليتفولو وما هي استخداماته؟

يحتوي ليتفولو على المادة الفعالة ريتليسيتينيب. يستخدم لعلاج الثعلبة الشديدة في البالغين والمراهقين الذين تبلغ أعمارهم ١٢ عامًا فما فوق. الثعلبة هي مرض يهاجم فيه جهاز المناعة في الجسم بصيالات الشعر، مما يتسبب في التهاب يؤدي إلى تساقط الشعر من فروة الرأس والوجه و/أو أجزاء أخرى من الجسم.

يعمل ليتفولو عن طريق تقليل نشاط الإنزيمات المسببة في التهاب بصيالات الشعر والتي تسمى JAK3 و TEC kinases. هذا المستحضر يقلل من الالتهاب؛ مما يؤدي إلى إعادة نمو الشعر لدى مرضى الثعلبة.

يجب أن تعرف بعض الآثار الجانبية والمواضيع التالية،

تحدث إلى طبيبك إذا تعرضت لأي من الآتي:

خطر الإصابة بالعدوى:

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل وأثناء العلاج مع ليتفولو إذا كنت:

- مصاب بعدوى (قد تكون العلامات المحتملة هي الحمى والتعرق والقشعريرة وآلام العضلات والسعال وضيق التنفس والدم في البلغم وفقدان الوزن والإسهال وآلام المعدة والحرق عند التبول والتبول أكثر من المعتاد والشعور بالتعب الشديد).
- مصاب بالسل أو كنت مصاب به سابقًا أو تعاملت مع شخص مصاب بالسل، أو إذا كنت تقيم أو تسافر في مناطق يكون فيها السل منتشر جدًا. سيقوم طبيبك بإجراء اختبار لمرض السل قبل بدء العلاج ب ليتفولو وقد يقوم بإجراء الاختبار أثناء العلاج.
- أصبت بعدوى الهربس (مثل: الجدري المائي أو القوباء المنطقية)، لأن ليتفولو قد يسمح لها بالعودة. أخبر طبيبك إذا أصبت بطفح جلدي مؤلم مع بثور لأن هذا يمكن أن يكون علامة على القوباء المنطقية.

اللقاحات:

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي إذا كنت قد تلقيت مؤخرًا أو تخطط للحصول على تطعيم (تحصين) على سبيل المثال: شلل الأطفال والتهاب-الكبدى-الوبائي-الثلاثي-الجدري المائي والمصل الثلاثي (الحصبة، النكاف، والحصبة الألمانية) والجدري المائي وفيروس الروتا). لا يوصى باستخدام هذه اللقاحات الحية مباشرة قبل وأثناء استخدام ليتفولو.

خطر الإصابة بالسرطان:

ليس من الواضح ما إذا كان ليتفولو يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وسيناقش طبيبك معك ما إذا كان العلاج بهذا الدواء مناسبًا وما إذا كانت الفحوصات بما في ذلك الفحوصات الجلدية المنتظمة ستكون ضرورية أثناء العلاج.

خطر حدوث جلطات دموية في الأوردة أو الرئتين:

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي إذا كان:

- لديك جلطات دموية في أوردة ساقيك (تجلط الأوردة العميقة) أو الرئتين (الانسداد الرئوي). أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من تورم مؤلم في الساق أو ألم في الصدر أو ضيق في التنفس إذ يمكن أن تكون هذه علامات على جلطات دموية في الأوردة.
- هناك إصابة سابقة من جلطات دموية في شريان العين (انسداد الشبكية) أو القلب (النوبة القلبية). أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من تغيرات حادة في بصرك (ضبابية الرؤية، أو فقدان جزئي أو كلي للبصر)، وألم في الصدر، وضيق في التنفس لأن هذه التغيرات قد تكون علامة على جلطات دموية في الشرايين.

خطر الأعراض العصبية:

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل وأثناء العلاج إذا كانت لديك أعراض غير مبررة ناتجة عن مشكلة في الجهاز العصبي أثناء تناول ليتفولو.

وسائل منع الحمل والحمل:

- يجب عدم استخدام ليتفولو أثناء الحمل.
- إذا كنت تخططين للإنجاب، فيجب عليك استخدام طريقة فعالة لمنع الحمل أثناء العلاج ب ليتفولو ولمدة شهر واحد على الأقل بعد آخر جرعة من ليتفولو. تحدث إلى طبيبك حول وسائل منع الحمل المناسبة لك.
- يرجى إخبار الطبيب على الفور في حالة حدوث حمل أو تعتقدي أنك ربما حملت أثناء العلاج لأن ليتفولو يمكن أن يضر بالطفل.

تفاصيل الإبلاغ عن الأعراض السلبية:

الهيئة العامة للغذاء والدواء – المركز الوطني للتقظ

مركز الاتصال الموحد: ١٩٩٩٩

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa

الموقع الإلكتروني: <http://ade.sfd.gov.sa/>

• قسم اليقظة الدوائية في الشركة

البريد الإلكتروني: SAU.AEReporting@pfizer.com

تمت الموافقة على هذا الملف من الهيئة العامة للغذاء والدواء.